

กระจายห่างๆ ขอดเกรสรีวแหลม พลาเซนตาแนวเดียว ผลชนิดแห้ง เป็นฝักแบน ยาว 8-12 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร แตกตามรอยตะเข็บทั้งสองข้าง

ชื่อ ชื่อข่ง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lagerstroemia indica* L.  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Lythraceae  
ชื่ออื่นๆ ตะแบกเกรียบ, เป็ชแดง, เป็ชเปลือกบาง, เป็ชเมว, เป็ชลอกเปลือก, คำช่อ  
ชื่อภาษาอังกฤษ Crape myrtle, Indica lilac

ไม้พุ่ม สูง 1-1.5 เมตร แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นทรงพุ่ม ใบเดี่ยว ออกสลับ ไม่มีก้านใบ แผ่นใบรูปรี กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 2.5-5 เซนติเมตร โคนและปลายมน ขอบใบมีหนามเล็กๆ จักเป็นฟันเลื่อย ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกช่อกระจุกแยกแขนง ออกที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาว 1-2 เซนติเมตรดอกย่อยสีม่วง เมื่อดอกบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 6 กลีบ ติดทนถึงผล กลีบดอกสีม่วง จำนวน 6 กลีบ ไม่ติดทน รูปกลม กว้าง-ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร โคนสอบเป็นก้าน ปลายมน ขอบหยักช่วยเป็นคลื่น เนื้อบาง เสรเพศผู้ จำนวนมาก ติดอยู่ที่โคนของกลีบเลี้ยงรูปถ้วยด้านใน เสรเพศเมีย ประกอบด้วย 6 พู 6 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ขอดเกรสแหลมมีรูเปิด ผลชนิดแห้ง กลมรี กว้าง 0.8-1 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร แตกกกลางพู

ชื่อ เทียนกิ่ง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lawsonia inermis* L.  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Lythraceae  
ชื่ออื่นๆ เทียนขาว, เทียนข้าวเปลือก, เทียนแดง, เทียนไม้  
ชื่อภาษาอังกฤษ Henna tree

ไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร ลำต้นสีเทา แตกกิ่งใกล้โคนต้น ทรงพุ่มโปร่ง ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ไม่มีก้านใบ แผ่นใบรูปรี กว้าง 1-1.4 เซนติเมตร ยาว 2.5-3 เซนติเมตร โคนรูปติ่ม ปลายแหลมเป็นติ่ง เนื้อหนา ดอกช่อแยกแขนง สีขาวนวล ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกสั้นมากหรือไม่มี สีแดง ดอกย่อยสีขาวนวล เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-0.6 เซนติเมตร ก้านดอกสีแดง ยาวประมาณ 0.1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว จำนวน 4 กลีบ โคนเชื่อมเป็นรูปถ้วย รูปไข่ กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ปลายแหลมสีชมพู ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอกสีขาวนวล จำนวน 4 กลีบ ติดที่รอยแยกของกลีบเลี้ยง รูปไข่ กว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.4

เซนติเมตร โคนสอบเป็นก้านเล็กๆ ปลายมน ขอบหยักเป็นคลื่น เนื้อบาง เกสรเพศผู้จำนวน 8 อัน  
ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ก้านชูอับเรณูสีขาว ติดที่กลางกลีบเลี้ยงกลีบละ 2 อัน อับเรณูและ  
ระอองเรณูสีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมียประกอบด้วย 4 พู 4 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ สีเขียว ยาว  
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรเรียวแหลม สีเหลืองอ่อน พลาเซนตารอบแกน  
ร่วม ผลชนิดแห้ง แตกตามรอยผนังกัน

ชื่อ จำปีแขก

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Michelia figo* (Lour.) Spreng.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Magnoliaceae

ชื่ออื่นๆ จำปาแขก

ชื่อภาษาอังกฤษ Dwarf chempaka, Champac

ไม้พุ่ม สูง 0.5-3 เมตร แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มกลมแน่น ใบเดี่ยว ออกสลับ ก้านใบยาว  
ประมาณ 0.8 เซนติเมตร แผ่นใบรูปรีขอบขนาน กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนติเมตร โคนและ  
ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ เนื้อใบหนา กลี้ยง ดอกเดี่ยว สี  
เหลืองนวล ออกที่ซอกใบ ก้านดอกยาว 0.8-1 เซนติเมตร มีขนสั้นสีน้ำตาลหนาแน่น เมื่อบานเส้นผ่า  
ศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตร ใบประดับ รูปรี โค้งเป็นพ้องเรือ สีน้ำตาลอ่อน มีขนสั้นน้ำตาลหนาแน่น  
กลีบรวม จำนวน 6 กลีบ ไม้คดทอน รูปใบหอก กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.5  
เซนติเมตร โคนสอบ ปลายแหลมมน ขอบเรียบ เนื้อหนา กลิ่นหอมอ่อนๆ เกสรเพศผู้ จำนวนมาก  
ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เกสรเพศเมีย ประกอบด้วยหลายพู แยกเป็นอิสระ เรียงตัวแน่นบนก้าน  
เกสร รังไข่เหนือวงกลีบ ผลกลุ่ม

ชื่อ โสมขบา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Abelmoschus moschatus* Medik. subsp. *tuberosus* (Span.) Borss. Waalk.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Malvaceae

ชื่ออื่นๆ ข้าวคัมเล็ก, เหง้ามหากาฬ, จีจ้อ, มหาก่าแดง

ชื่อภาษาอังกฤษ Abel musk, Musk mallow, Musk seed

ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล มีขนสั้นน้ำตาลยาว ใบเดี่ยวออกเวียนสลับ ก้านใบยาว 3-4.5  
เซนติเมตร แผ่นใบรูปสามเหลี่ยม ปลายเว้าลึกเป็น 3 แฉกรูปนิ้วมือ กว้าง 4.5-7.5 เซนติเมตร ยาว 5-  
7 เซนติเมตร โคนรูปเฉียงใบหอก ปลายแหลม ขอบหยัก เนื้อใบคายมือ ด้านหลังใบมีขน ด้านท้องใบ  
มีขนรูปดาวหนาแน่น เส้นใบชัดเจน ดอกเดี่ยวสีส้ม ออกที่ซอกใบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 8 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 4-5 เซนติเมตร รั้วประดับสีเขียว จำนวน 8 อัน รูปเข็ม ขอบมีขนสีขาวยาว ติดทนถึงผลแก่ กลีบเลี้ยงสีเขียว เชื่อมติดเป็นแผ่นเดียว รูปท้องเรือ เนื้อบาง ด้านนอกมีขนชนิดปลายเป็นค่อม กลีบดอกสีส้ม จำนวน 5 กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 3.5-4 เซนติเมตร เนื้อบาง ปลายมน ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย ด้านหลังกลีบสีส้ม ด้านท้องกลีบสีขาว มีขนชนิดปลายเป็นค่อม เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูอับเรณูสีขาวเชื่อมเป็นหลอดยาว โคนหลอดเชื่อมกับโคนกลีบดอก รอบๆ หลอดมีก้านเล็กๆ ขึ้นออกมา ปลายก้านมีอับเรณูสีเหลืองเข้ม เกสรเพศเมียประกอบด้วย 5 พู 5 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ก้านเกสรสอดอยู่กลางหลอดก้านชูอับเรณู ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีแดงเข้ม ยอดเกสรรูปแตรมีขนสีแดง พลาเซนตารอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง กลมรีรูปหัวใจ กว้าง 1.8-2 เซนติเมตร ยาว 2.5-3 เซนติเมตร แตกกกลางพู

ชื่อ ฝ้ายแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gossypium arboreum* L.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Malvaceae

ชื่ออื่นๆ

ชื่อภาษาอังกฤษ Ceylon cotton, Chinese cotton, Tree cotton

ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล มีขนสีขาวหนาแน่น แตกกิ่งใกล้โคนต้นชูตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบยาว 4-5 เซนติเมตร มีขนสีขาว แผ่นใบรูปกลม กว้างยาว 4-7.5 เซนติเมตร โคนรูปหัวใจ ปลายเป็นติ่ง ขอบหยักลึกรูปนิ้วมือ จำนวน 3-5 แฉก เนื้อใบบาง ด้านท้องใบมีขนขาว และมีจุดสีแดง เส้นใบชัดเจนสีแดง ดอกเดี่ยวสีแดงเข้ม ออกที่ซอกใบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร รั้วประดับสีเขียว จำนวน 3 อัน รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร โคนเชื่อมติดกัน ปลายเป็นติ่ง มีเส้นสีแดง ติดทนถึงผลแก่ ด้านนอกมีขนสีขาวและมีจุดสีแดงทั่วไป กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ด้านนอกสีเขียว มีขนและจุดสีแดง ด้านในสีขาว ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอกสีแดงเข้ม จำนวน 5 กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 4-4.5 เซนติเมตร โคนสอบเรียว ปลายมน ขอบเป็นคลื่น เนื้อบาง ด้านท้องกลีบมีขนสีขาว เกสรเพศผู้ จำนวนมาก ก้านชูอับเรณูเชื่อมเป็นหลอด รอบๆ หลอดมีก้านเล็กๆ จำนวนมาก สีแดง อับเรณูสีเหลืองเข้ม เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ สีเขียวจุดสีแดง ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรเป็นรูเปิด พลาเซนตารอบแกนกลาง ผลชนิดแห้ง แตกกกลางพู เมล็ดหุ้มด้วยเส้นใยสีขาว

ชื่อ ชบา  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hibiscus rosa-sinensis* L.  
ชื่อท้องถิ่น -  
ชื่อวงศ์ Malvaceae  
ชื่ออื่นๆ ชุมบา, บา, โห่หม่แดง, โห่หม่, ชบาขาว  
ชื่อภาษาอังกฤษ China rose, Shoe flower

ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล มีขนรูปดาว แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นทรงพุ่ม ใบเดี่ยวออกเวียนสลับ ก้านใบยาว 1.5-3 เซนติเมตร มีขนสีขาวหนาแน่น มีหูใบรูปเข็ม 1 อัน แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 4.5-6.5 เซนติเมตร ยาว 5.5-8.5 เซนติเมตร โคนตัด ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบค่อนข้างบาง เหนียว ด้านท้องใบมีขนที่เส้นใบ ดอกช่อแบบกลุ่มมีประมาณ 6 ดอกย่อย อยู่บนฐานดอกเดียวกัน มีหลายสีคือ สีแดง สีเหลือง สีชมพู สีส้ม และสีขาว ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร รั้วประดับสีเขียว รูปเข็ม จำนวน 7 อัน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเล็ก 0.3-0.5 เซนติเมตร รูปประฆัง มีขนสีขาว กลีบดอก จำนวน 5 กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 5-5.5 เซนติเมตร โคนสอบเป็นก้านเชื่อมติดกัน ขอบหยักเป็นคลื่น ปลายมน เนื้อบาง ก้านกลีบดอกเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาวประมาณ 1.4 เซนติเมตร ก้านเกสรสีแดงเชื่อมติดกันเป็นหลอด แดกแขนงเล็กๆ บริเวณปลายหลอด อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมียประกอบด้วย 6 พู 6 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร รังไข่สีเหลือง ก้านเกสรจำนวน 6 อัน พันเป็นเกลียวอยู่ตรงกลางหลอดเกสรเพศผู้ มีขนสีขาว ปลายยอดแยกเป็นอิสระ ยอดเกสรเป็นเนื้อหนา มีน้ำเหนียวๆ พลาเซนตารอบแกนร่วม รังไข่ไม่พัฒนาเป็นผล

ชื่อ กระเจี๊ยบแดง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hibiscus sabdariffa* L.  
ชื่อท้องถิ่น -  
ชื่อวงศ์ Malvaceae  
ชื่ออื่นๆ กระเจี๊ยบ, กระเจี๊ยบเปรี้ยว, ผักแก้งเค็ง, ส้มแก้งเค็ง, ส้มตะเลงเครง, ส้มปู  
ชื่อภาษาอังกฤษ Roselle, Sorrel, Jamaican sorrel

ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ลำต้นสีแดง แตกกิ่งที่โคนต้น ชูตั้งขึ้น ทรงต้นโปร่ง ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบสีแดง บริเวณโคนใบพองเป็นเนื้อหนาสีแดงขาว 1.5-6 เซนติเมตร มีขนสีขาวยาว แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 1.2-1.8 เซนติเมตร ยาว 4-9 เซนติเมตร โคนรูปลิ้ม ปลายแหลม ขอบเรียบ ใบแก่ขอบเว้าลึกเป็น 3-5 แฉก รูปนิ้วมือด้านหลัง ใบสีเขียวเข้ม เส้นใบสีแดง ด้านท้องใบสีเขียวอ่อนกว่า เส้นใบไม่ชัดเจน ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกก้านใบ สีเหลืองนวลอมชมพู เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5-5

เซนติเมตร รั้วประดับจำนวน 10-11 อัน รูปไข่กว้างประมาณ 0.25 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.9 เซนติเมตร โคนสีเขียว ปลายแหลมสีแดงเข้ม มีขนที่ขอบ เนื้อหนาดัดทอนถึงผลแก่ กลีบเลี้ยงจำนวน 5 กลีบ รูปไข่กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร โคนเชื่อมติดกัน ด้านนอกสีแดง มีขนที่โคน ด้านในสีเขียว มีขนสีขาวยาวหนาแน่น เมื่อแก่เนื้อจะหนา ขนาดใหญ่ขึ้น สีแดงสด คัดทอนถึงผลแก่ กลีบดอก จำนวน 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม รูปไข่กลับ กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร ปลายตัด ขอบหยักเป็นคลื่น สีเหลืองนวล โคนสอบ สีแดงเข้ม เกสรเพศผู้ เป็นหลอดสีแดงยาว ตั้งขึ้น ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร แดกแขนงเป็นก้านชูอับเรณูเล็กๆ จำนวนมาก สีแดง อับเรณูสีแดง ละอองเรณูสีส้ม เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 5 ช่อง ยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร รังไข่เหนือวงกลีบ สีเขียว มีขนสีขาวหนาแน่น ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรบานออกรูปจาน มีขนสีแดงกำมะหยี่หนาแน่น พลาเซนตาติครอบแกนร่วม ผลแก่แตกกลางพู

ชื่อ หม่อน  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Morus alba* L.  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Moraceae  
 ชื่ออื่นๆ  
 ชื่อภาษาอังกฤษ White mulberry, Mulberry tree

ไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร ต้นสีน้ำตาล มีรูช่องอากาศเป็นจุดๆ แดกกิ่งที่โคนต้น ใบเดี่ยวออกเวียนสลับ ก้านใบยาว 1.5-3 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 5.5-7 เซนติเมตร ยาว 9-12 เซนติเมตร โคนเฉียง ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบคายมือ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านท้องใบสีอ่อนกว่า เส้นใบชัดเจน ดอกช่อเชิงลด ออกจากตาที่ซอกใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ดอกย่อยสีเหลืองอมส้ม ขนาดเล็กมาก เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 0.1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเหลืองอมส้ม ลดรูปเป็นเกล็ดใสๆ จำนวน 4 กลีบ กลีบดอกลดรูปเป็นเกล็ดสีส้มอวบน้ำ โคนรูปท้องเรือ จำนวน 4 กลีบ เกสรเพศผู้ไม่พัฒนา เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 1 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉก มีขนสีขาวหนาแน่น พลาเซนตาที่ยอด ยอดเกสรติดทอนถึงผลแก่ ผลชนิดสดเป็นช่อสีแดง ฉ่ำน้ำ

ชื่อ รามใหญ่  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ardisia elliptica* Thunb.  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Myrsinaceae  
 ชื่ออื่นๆ กระดุกไก่, ก้างปลา, ก้างปลาเขา, เหมือด, ช้ายรวมใบใหญ่, พิลังกาสา, ทูลังกาสา,

ลึงพินาศ, ป้อนา

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล มีรอยแผลเป็นที่เกิดจากการหลุดร่วงของใบ แตกกิ่งใกล้โคนต้น ใบเดี่ยวออกเวียนสลับ ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปใบหอก กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 9-15 เซนติเมตร โคนรูปกลม ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม ด้านหลังใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านท้องใบสีอ่อนกว่า ผิวเกลี้ยง ดอกช่อกระจุก ออกที่ซอกใบใกล้ยอด ก้านช่อดอกยาว 1-3 เซนติเมตร ดอกย่อยสีขาวอมม่วง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีขาว นวล จำนวน 4 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉกโค้งมน ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร กลีบดอกจำนวน 5 กลีบ รูปไข่ กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ก้านเกสรสีขาว อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรเป็นรูเปิด พลาเซนตาที่ฐาน ผลชนิดแห้ง

ชื่อ มิกกีเมาส์  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ochna kirkii* Oliv.  
ชื่อพ้อง  
ชื่อวงศ์ Ochnaceae  
ชื่ออื่นๆ  
ชื่อภาษาอังกฤษ Micky mouse

ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล มีรูช่องอากาศเป็นจุดสีขาวที่ต้นและกิ่ง ใบเดี่ยวออกสลับ ก้านใบสั้นมากถึงไม่มี แผ่นใบรูปรี กว้าง 1.8-4 เซนติเมตร ยาว 4.5-8.5 เซนติเมตร โคนมน ปลายแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย มีหนามเล็กตรงรอยจัก เนื้อใบคล้ายกระดาษ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกช่อกระจุก ออกที่ปลายช่อหรือกิ่ง ก้านช่อดอกสั้น ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ดอกย่อย เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีแดงเข้ม จำนวน 5 กลีบ เรียงซ้อนกัน รูปไข่กว้าง 0.8-1 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร เนื้อกลีบหนาและเหนียว ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอกสีเหลืองเข้ม จำนวน 5 กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 0.8-1 เซนติเมตร ยาว 1.3-1.8 เซนติเมตร เนื้อบาง หลุดร่วงได้ง่าย เกสรเพศผู้ จำนวนมาก เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 4 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ รูปกลมภายหลังการผสมเกสรรังไข่จะขยายขนาดลักษณะเป็นดуг สีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีดำ ยอดเกสรเรียวแหลม มีรูเปิด ผลชนิดสด

ชื่อ มะลิลา  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Jasminum sambac* (L.) Aiton  
ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Oleaceae  
 ชื่ออื่นๆ มะลิ, มะลิขี้ไก่, มะลิซ้อน, มะลิป้อม, มะลิหลวง, ข้าวแตก, เด็ยมูน  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Arabian jasmine

ไม้พุ่ม สูง 0.5-1 เมตร แตกกิ่งบริเวณโคนต้น ลำต้นสีเทา กิ่งอ่อนสีเขียว ใบเดี่ยวออกตรงข้าม ก้านใบสั้นพองเป็นเนื้อหนา ยาว 0.3-0.5 เซนติเมตร มีขน แผ่นใบรูปรี กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร โคนมน ปลายแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่นอ่อน เนื้อใบคล้ายกระดาษ ด้านหลังใบสีเขียว เข้มกว่าด้านท้องใบ เส้นใบชัดเจน ดอกช่อกระจุกซ้อน ก้านช่อดอกยาว 3-5.5 เซนติเมตร สีเขียว มีขน ดอกย่อยสีขาว มีกลิ่นหอม บานเต็มที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร ก้านดอกสีเขียว ยาว 1-1.5 เซนติเมตร มีขนเบาบาง กลีบเลี้ยงสีเขียว ลักษณะเป็นเส้น จำนวน 10 อัน มีขน ยาว 1-1.2 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว จำนวน 9 กลีบ เรียงซ้อนเป็น 2 วง โคนกลีบเชื่อมเป็นหลอดแคบ สีเขียวอ่อน ยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นกลีบสีขาว รูปไข่ กว้าง 0.6-0.8 เซนติเมตร ยาว 1-1.1 เซนติเมตร ปลายแหลม เนื้อกลีบหนา มีกลิ่นหอม เกสรเพศผู้ จำนวน 2 อัน ยาว 0.5-0.6 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเขียว ติดอยู่ตรงกลางของหลอดกลีบดอก อับเรณูและละอองเรณูสีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 2 ช่อง รังไข่กึ่งได้วงกลีบ ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเขียว ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉกเล็ก พลาเซนตาติดที่ฐาน

ชื่อ ปาล์มไผ่  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Chamaedorea erumpens* H.E.Moore  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Palmae (Arecaceae)  
 ชื่ออื่นๆ -  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Bamboo palm

ปาล์มลำต้นแตกกอ สูง 1-2 เมตร ลำต้นห่อหุ้มด้วยกาบใบสีเขวแห้งๆ ลักษณะคล้ายไผ่ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ใบประกอบยาว 30-50 เซนติเมตร ก้านใบยาว 10-20 เซนติเมตร โคนก้านแผ่เป็นกาบหุ้มต้น แผ่นใบย่อยรูปรีขอบขนาน กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร โคนรูปป้อม ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างบาง ช่อดอกเชิงลดแยกแขนง ออกที่โคนต้น ก้านช่อดอกสั้น ดอกย่อยสีเหลือง ขนาดเล็ก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ

ชื่อ จิ้ง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Rhapis excelsa* (Thunb.) Henry ex Rehder  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Palmae (Arecaceae)

ชื่ออื่นๆ เห่าसान, หมากญี่ปุ่น, จิ้งญี่ปุ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ Lady palm, Bamboo palm, Japanese peace palm

ปล้ำมลำต้นแตกกอ สูง 2-3 เมตร ลำต้นห่อหุ้มด้วยกาบใบสีน้ำตาลแห้งๆ ใบประกอบแบบนี้  
ใบรูปพัด กว้างประมาณ 30 เซนติเมตร ก้านใบยาว 15-20 เซนติเมตร โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น  
แผ่นใบย่อยรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบ  
เรียบ เนื้อใบหนา ผิวเกลี้ยงเป็นมัน ช่อดอกเชิงลดแยกแขนง ออกที่ซอกก้านใบใกล้ยอด ก้านช่อดอก  
สั้น ดอกย่อยขาวนวล แยกเพศอยู่คนละช่อ แต่อยู่บนต้นเดียวกัน

ชื่อ เจตมูลเพลิงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Plumbago indica* L.

ชื่อพ้อง *P. rosea* L.

ชื่อวงศ์ Plumbaginaceae

ชื่ออื่นๆ ปีกปิวแดง, ไฟใต้ดิน, อุบะกูจี, กุยวู, ตั้งชูไว้

ชื่อภาษาอังกฤษ Rose coloured leadwort, Fire plant

ไม้พุ่ม สูง 1-1.5 เมตร ขอดอ่อนสีแดง กิ่งอ่อนสีเขียวปนแดง แตกกิ่งใกล้โคนต้น ชูก้านช่อดอก  
ตั้งขึ้น ใบเดี่ยวออกสลับ ก้านใบและแกนกลางใบอ่อนสีแดง ยาว 0.8-1 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่  
กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 8-13 เซนติเมตร โคนรูปปลี ปลายเรียวแหลม ขอบเป็นคลื่น เนื้อใบบาง  
ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกช่อเชิงลดช้อน สีแดงสด ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยสีแดง  
เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีแดง เป็นหลอด ยาว 0.6-1 เซนติเมตร  
ปลายเว้าเป็นพื้นแหลมคั่นๆ ด้านนอกมีขนชนิดปลายเป็นค้อมใส ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอกสีแดงสด  
โคนเชื่อมเป็นหลอดแคบ ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 0.5-0.7  
เซนติเมตร ยาว 1-1.2 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งแหลม ขอบเป็นคลื่นอ่อนๆ เมื่อกลิบบาง เกสรเพศผู้  
จำนวน 5 อัน ยาว 2-2.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีแดง ติดที่โคนหลอด อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย  
ประกอบด้วย 5 พู 1 ช่อ รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร พลาเซนตาที่ฐาน ผลชนิด  
แห้ง

ชื่อ เจตมูลเพลิงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Plumbago zeylanica* L.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Plumbaginaceae

ชื่ออื่นๆ แปะฮวยดั่ง, ปีกปิวขาว, คอชวา, ตั้งชูอ้วย

ชื่อภาษาอังกฤษ Ceylon leadwort, White leadwort

ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ลำต้นสีเขียว กลมเกลี้ยง แตกกิ่งใกล้โคนต้น ชูก้านช่อดอกตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกสลับ ก้านใบยาว 0.8-1 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 3.3-4.5 เซนติเมตร ยาว 7.3-9 เซนติเมตร โคนสอบเรียว ปลายเรียวแหลม ขอบเป็นคลื่น เนื้อใบบาง ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกช่อเชิงลดช้อน สีขาวออกเขียว ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาว 2-2.5 เซนติเมตร ดอกย่อยสีขาว เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว จำนวน 5 กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 1-1.2 เซนติเมตร กว้าง 0.15-0.2 เซนติเมตร ปลายเว้าเป็นฟันแหลมตื้นๆ ด้านนอกมีขนชนิด ปลายเป็นค่อมใส ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอกสีขาว จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมเป็นหลอดแคบ สีขาว ยาว 2-2.2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นกลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 0.3-0.4 เซนติเมตร ยาว 0.7-1 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ขอบเป็นคลื่นอ่อนๆ เนื้อกลีบบาง เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาว 2-2.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว ติดที่โคนหลอด อับเรณูสีม่วงเข้ม เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 1 ช่อ รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร รูปรี ผิวขรุขระเป็นสันจำนวน 5 สัน ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉก พลาเซนตาที่ฐาน ผลชนิดแห้ง

ชื่อ ทับทิม

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Punica granatum* L. var. *granatum*

ชื่อห้อง

ชื่อวงศ์ Punicaceae

ชื่ออื่นๆ พิล้า, พิล้าขาว, มะก่องแก้ว, มะเกี๊ยะ, เขียยะถั่ว, หมากจั่ง

ชื่อภาษาอังกฤษ Pomegranat

ไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มโปร่ง ใบเดี่ยวออกตามข้อ สลับตั้งฉาก ก้านใบสีแดงยาว 0.4-0.5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 1-1.6 เซนติเมตร ยาว 3-6 เซนติเมตร โคนรูปสามเหลี่ยม ปลายเรียวมน ขอบเป็นคลื่นน้อยๆ เนื้อใบคล้ายกระดาษ ผิวเกลี้ยงเป็นมัน ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกก้านใบ สีส้มหรือสีขาว ก้านดอกไม่มี เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีส้ม จำนวน 6 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแหลมแยกเป็นแฉก กว้าง 0.5-0.7 เซนติเมตร ยาว 1-1.2 เซนติเมตร เนื้อหนา ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอก สีส้มหรือสีขาว จำนวน 6 กลีบ รูปใบหอก กว้าง 2-2.2 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร โคนสอบเป็นก้าน ติดที่รอยแยกของกลีบ ปลายมน ขอบหยักเป็นคลื่น เนื้อบาง ไม้ติดทน เกสรเพศผู้ จำนวนมาก ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร ก้านเกสรสีส้ม ติดที่ผนังรูปถ้วยด้านในของกลีบเลี้ยง อับเรณูสีน้ำตาล ละอองเรณูสี เหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วยหลายพูหลายช่อ รังไข่กึ่งได้วงกลีบ ยาวประมาณ 3.2 เซนติเมตร ก้านเกสรสีน้ำตาล ยอดเกสรบานออกเล็กน้อย พลาเซนตาติดทั่วผนัง ผลสด เม็ดพองเป็น เนื้อน้ำ

ชื่อ พุดซ้อน  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gardenia augusta* (L.) Merr.  
 ชื่อพ้อง *G. jasminoides* J.Ellis  
 ชื่อวงศ์ Rubiaceae  
 ชื่ออื่นๆ พุดใหญ่, เกลดวา, แคนวา, พุดจีน, พุทธรักษา  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Cape gardenia, Cape jasmine

ไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มกลม ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม  
 สลับตั้งฉาก ก้านใบ ยาว 1-1.5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปหอกหรือรูปไข่กลับ กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว  
 8-10 เซนติเมตร โคนรูปลิ้น ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบหนา เป็นมัน ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่า  
 ด้านท้องใบ ดอกเดี่ยว สีขาว กลิ่นหอม ออกที่ซอกก้านใบ เมื่อบานเต็มผ่านศูนย์กลาง 6-7 เซนติเมตร  
 ก้านดอกสั้นอวบหนา กลีบเลี้ยงหนาเป็นสัน 6 สัน กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5-12  
 กลีบ ช่อสั้นหลายชั้น ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ปลายมน เนื้อกลีบหนา เกสรเพศผู้ จำนวน 6-12  
 อัน ก้านเกสรสีขาว อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย รังไข่ได้วงกลีบ พลาเซนทารอบแกนร่วม ผลสด มี  
 สันคามยาวของผล 4-7 เส้น เมื่อสุกสีเหลือง เมล็ดมาก

ชื่อ ประทัดทอง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hamelia patens* Jacq.  
 ชื่อพ้อง  
 ชื่อวงศ์ Rubiaceae  
 ชื่ออื่นๆ ประทัดได้หวัน, ประทัดเล็ก  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Scarlet bush, Fire bush

ไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มหนา ใบเดี่ยว ออก  
 เป็นวงรอบข้อ ก้านใบสีแดง ยาว 1.5-3 เซนติเมตร มีขน แผ่นใบรูปรี กว้าง 3-4.5 เซนติเมตร ยาว 5-  
 10 เซนติเมตร โคนรูปลิ้น ปลายแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่นอ่อนๆ เนื้อใบบาง มีขนที่เส้นใบ ดอกช่อ  
 แยกแขนง สีส้ม ก้านช่อดอกสีแดง ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีขน ดอกย่อย สีส้ม ก้านดอกสั้นมาก  
 สีแดง มีขน กลีบเลี้ยงสีแดง จำนวน 5 กลีบ เป็นเกล็ดเล็กๆ เชื่อมติดกับฐานรองดอกรูปถ้วย กลีบ  
 ดอกสีส้ม จำนวน 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 1.4 เซนติเมตร ปลายจักเป็นฟันเลื่อย  
 เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ก้านเกสรสีแดง ยาวประมาณ 1.1 เซนติเมตร ติดด้านในหลอดกลีบดอกตรง  
 รอยคอด อับเรณูสีแดง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 5 ช่อง รังไข่กึ่งได้วงกลีบ สีแดง ยาวประมาณ  
 2 เซนติเมตร ก้านเกสรสีแดง ปลายสอบ พลาเซนทารอบแกนร่วม ผลไม้พัฒนา

ชื่อ เข็มเหลือง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ixora chinensis* Lam.  
 ชื่อท้องถิ่น -  
 ชื่อวงศ์ Rubiaceae  
 ชื่ออื่นๆ -  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Yellow santan

ไม้พุ่ม สูง 0.5-1 เมตร แตกกิ่งที่โคนต้น เป็นพุ่มแน่น ลำต้นสีน้ำตาล มีรอยแผลเป็นที่เกิดจากการหลุดร่วงของใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบไม่มี หูใบเป็นเกล็ดสีน้ำตาล ออกตรงข้ามสลับกับใบ แผ่นใบรูปไข่กลับ กว้าง 0.7-2.1 เซนติเมตร ยาว 1-3.5 เซนติเมตร โคนมน ปลายเป็นติ่งแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบหนา ด้านหลังใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านท้องใบสีอ่อนกว่า ดอกช่อกระจุกซ้อน ไม่มีก้านช่อดอก ดอกย่อยสีเหลือง กลีบเลี้ยงจำนวน 4 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย สีเขียว ปลายแหลม 4 แฉก สีแดง ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร กลีบดอกจำนวน 4 กลีบ โคนเชื่อมเป็นหลอดแคบ ยาว 2-2.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 4 กลีบออกในแนวระนาบตั้งฉากกับหลอด รูปไข่ กว้าง 0.2-0.3 เซนติเมตร ยาว 0.5-0.6 เซนติเมตร ปลายแหลม เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ก้านเกสรไม่มี อับเรณูสีเหลือง ติดตรงแฉกของกลีบดอก ละอองเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 2 ช่อง รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ ก้านเกสรสีแดง ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉก ผลาเนนดาติดที่ยอด ผลชนิดสด กลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.7 เซนติเมตร

ชื่อ เข็มฝรั่ง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ixora coccinea* L.  
 ชื่อท้องถิ่น -  
 ชื่อวงศ์ Rubiaceae  
 ชื่ออื่นๆ เข็มหนู, เข็มบ้าน

ชื่อภาษาอังกฤษ Flame of the woods, Flame flower

ไม้พุ่ม สูง 0.3-0.5 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มแน่น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบสั้นถึงไม่มี หูใบสีเขียว รูปสามเหลี่ยม จำนวน 2 อัน ออกสลับกับใบ แผ่นใบรูปใบหอกหรือรูปไข่กลับ กว้าง 0.8-1.2 เซนติเมตร ยาว 3-4 เซนติเมตร โคนรูปติ่ม ปลายเป็นติ่งแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่นอ่อนๆ เนื้อใบคล้ายกระดาษ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มมัน ด้านท้องใบสีอ่อนกว่า ดอกช่อกระจุกซ้อน มีหลายสี สีแดง สีขาว สีชมพู ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ดอกย่อย เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปถ้วย ปลายเว้าเป็น 4 หยัก ยาวประมาณ 0.1 เซนติเมตร ติดทนถึงผล กลีบดอก เป็นหลอดแคบ ปลายแยกเป็น 4 กลีบ ในระนาบตั้งฉากกับหลอด รูปไข่ กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.3

เสนติเมตร ปลายแหลม เนื้อหนา เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ติดที่รอยแยกสลักกับกลีบดอก อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 1 ช่อง รังไข่ได้วงกลีบ ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉก พลาเซนตาติดที่ฐาน

ชื่อ ชื่อเต็มพวงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ixora finlaysoniana* Wall. ex. G. Don

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Rubiaceae

ชื่ออื่นๆ เข็มขาว

ชื่อภาษาอังกฤษ Siamese white Ixora

ไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร ลำต้นสีเทาปนเขียว แตกกิ่งที่โคนต้น เป็นพุ่มสูง ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลักตั้งฉาก ก้านใบสั้น พองเป็นเนื้อหนา ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร หูใบเป็นเกล็ดสีน้ำตาล ออกตรงข้ามสลักกับใบ แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 3.5-6 เซนติเมตร ยาว 8-13 เซนติเมตร โคนรูปกลม ปลายแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย เนื้อใบคล้ายกระดาษ ด้านหลังสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกช่อกระจุกซ้อน สีขาว ก้านช่อดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอกย่อยสีขาวมีกลิ่นหอม ก้านดอกย่อยสั้นมากถึงไม่มี กลีบเลี้ยงสีเขียว จำนวน 4 กลีบ รูปรี กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว จำนวน 4 กลีบ โคนเชื่อมเป็นหลอดแฉก ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 4 แฉกในแนวระนาบตั้งฉากกับหลอด รูปไข่ กว้าง 0.3-0.35 เซนติเมตร ยาว 0.5-0.7 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ก้านชูอับเรณูสีขาว ติดที่รอยแยกระหว่างกลีบดอก ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร อับเรณูสีขาว ละอองเรณูสีเหลืองเข้ม เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 2 ช่อง รังไข่ได้วงกลีบ ยาวประมาณ 2.7 เซนติเมตร ก้านชูอับเรณูสีเขียว ยอดเกสรสีเขียวแยกเป็น 2 แฉก พลาเซนตาติดที่ฐาน ผลชนิดสด

ชื่อ ชื่อเต็มเสรมฐิ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ixora macrothyrsa* Teijsm. & Binn.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Rubiaceae

ชื่ออื่นๆ เข็มแดง, เข็มใหญ่

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มแน่น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลักตั้งฉาก ก้านใบสั้นถึงไม่มี หูใบสีแดง รูปสามเหลี่ยม ปลายแหลมเป็นเส้น จำนวน 2 อัน ออกสลักกับใบ แผ่นใบรูปไข่กลับ กว้าง 3-6.5 เซนติเมตร ยาว 7-17 เซนติเมตร โคนรูปกลม ปลายแหลม

ขอบเรียบ เนื้อใบคล้ายกระดาษ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านท้องใบสีอ่อนกว่า ดอกช่อกระจุก  
 ช้อน สีแดง ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ดอกย่อยสีแดง เมื่อบานเส้นผ่า  
 ศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีแดง รูปถ้วย ปลายเว้าเป็น 4 หยัก ยาวประมาณ 0.1  
 เซนติเมตร ติดทนถึงผล กลีบดอกสีแดงเข้ม จำนวน 4 กลีบ โคนเชื่อมเป็นหลอดแคบ ยาวประมาณ 3  
 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 4 แฉกในแนวระนาบตั้งฉากกับหลอด รูปไข่ กว้างประมาณ 0.5  
 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายแหลม เนื้อหนา เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ก้านเกสรสี  
 แดงเข้ม ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ติดที่รอยแยกสลับกับกลีบดอก อับเรณูสีแดง ละเอียดเรณูสี  
 เหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 1 ช่อ รังไข่ได้วงกลีบ ยาวประมาณ 3.2 เซนติเมตร ก้าน  
 เกสรสีแดง ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉก ปลายขนาคิดที่ฐาน

ชื่อ คอลฆ่าออโรรา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Mussaenda philippica* A.Rich. var. *aurorae*

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Rubiaceae

ชื่ออื่น ๆ กุณหญิงอรุณขาว, คอลฆ่าดอกขาว

ชื่อภาษาอังกฤษ Dona aurora, Virgin tree, Buddha's lamp

ไม้พุ่ม สูง 1.3 เมตร แตกกิ่งใกล้โคนต้น ทรงพุ่มโปร่ง ลำต้นสีน้ำตาล มีขนหนาแน่น ใบเดี่ยว  
 ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบสั้น ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีขน แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 4-8  
 เซนติเมตร ยาว 8-16 เซนติเมตร โคนมน ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่น เนื้อใบหนาแน่น ด้าน  
 หลังใบสีเขียวเข้ม มีขนที่เส้นใบ ด้านท้องใบสีอ่อนกว่า มีขน เส้นใบชัดเจน ดอกช่อกระจุกช้อน  
 ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ก้านช่อดอกยาว 2-4 เซนติเมตร มีขนหนาแน่น ดอกย่อยสีส้ม กลีบเลี้ยง  
 สีขาวอมเขียว เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกลีบดอก จำนวน 5 กลีบ รูปไข่ กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-7.5  
 เซนติเมตร โคนสอบเรียวลักษณะคล้ายก้าน ยาว 1-2 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม ขอบ  
 เรียบ เนื้อนุ่มหนา มีขนด้านหลังกลีบและด้านท้องกลีบ กลีบดอก จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน  
 เป็นหลอดสีเขียวยาวประมาณ 2.3 เซนติเมตร มีขนด้านนอกและด้านใน ปลายแยกเป็นกลีบ รูปไข่  
 กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร ด้านบนสีเหลืองเข้ม ด้านล่างสีเขียว  
 ปลายแหลมเป็นหาง เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ติดอยู่ด้านในตรงกลางของหลอดกลีบดอก ยาว  
 ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีน้ำตาล ยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร อับเรณูสีน้ำตาล เกสรเพศ  
 เมีย ประกอบด้วย 2 พู 2 ช่อ รังไข่ได้วงกลีบ ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร สีเขียว มีขนหนาแน่น  
 ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเขียว ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉก ปลายขนาคารอบแกนร่วม

ชื่อ แววิเชียร  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Angelonia goyazensis* Benth.  
 ชื่อท้องถิ่น *A. salicariifolia* Humb. & Bonpl.  
 ชื่อวงศ์ Scrophulariaceae  
 ชื่ออื่นๆ เทียนญี่ปุ่น  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้พุ่ม สูง 0.75-1 เมตร ลำต้นสีเขียว มีขนชนิดปลายเป็นต่อม แตกกิ่งใกล้โคนต้นชูตั้งขึ้น เป็นพุ่มโปร่ง ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ไม่มีก้านใบ แผ่นใบรูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 0.4-0.7 เซนติเมตร ยาว 2.5-8 เซนติเมตร โคนมนหรือตัด ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบบางนุ่ม ด้านหลังใบและท้องใบสีเขียว มีขนชนิดปลายเป็นต่อม ดอกเดี่ยวสีม่วง ออกที่ซอกใบตลอดกิ่งลักษณะคล้ายช่อดอก ก้านดอกสีม่วง มีขนชนิดปลายเป็นต่อมหนาแน่น ยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8-2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง จำนวน 5 กลีบ รูปไข่ กว้าง 0.1-0.15 เซนติเมตร ยาว 0.3-0.4 เซนติเมตร ด้านนอกสีเขียวปนแดง มีขนชนิดปลายเป็นต่อม ด้านในสีเขียว กลีบเลี้ยง เรียงทับซ้อนกัน กลีบดอกสีม่วงเข้ม จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน โค้งเป็นท้องกระหะ ปลายแยกเป็นกลีบ กว้าง 0.6-0.8 เซนติเมตร ยาว 0.6-0.8 เซนติเมตร ตรงกลางสีม่วงอ่อน ขอบสีม่วงเข้ม มีเดือยสีขาว 2 เส้นคู่คล้ายฟันหนู เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว อับเรณูสีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 2 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร รูปกลม สีเขียวปนแดง ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรเรียวแหลม ผลาเนคารอบแฉกพร้อม ผลชนิดแห้ง

ชื่อ ประทัดฝรั่ง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Russelia equisetiformis* Schltdl. & Cham.  
 ชื่อท้องถิ่น *R. juncea* Zucc.  
 ชื่อวงศ์ Scrophulariaceae  
 ชื่ออื่นๆ -  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้พุ่ม สูง 0.75-1 เมตร ลำต้นสีเขียว เป็นร่อง แตกกิ่งเป็นวงรอบ จำนวนมาก ต้นทำหน้าที่สังเคราะห์แสงแทนใบ ใบเดี่ยว ขนาดเล็กมาก ออกเป็นวงรอบข้อ จำนวน 4 ใบต่อข้อ ก้านใบยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร แผ่นใบรูปรี กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร โคนรูปกลม ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบบาง ด้านหลังใบและท้องใบสีเขียว ดอกช่อกระจุกด้านเดียว ออกที่ซอกใบตลอดกิ่งลักษณะคล้ายช่อดอก ก้านช่อดอก ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ดอกย่อยสีแดงสด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียวปน

แดง จำนวน 5 กลีบ รูปรี กว้างประมาณ 0.1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร โคนเชื่อมติด  
แน่นกับฐานรองดอก ติดทนถึงผล กลีบดอก สีแดง จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ด้าน  
นอกสีแดงสด ด้านในสีขาว ยาว 1.6-1.8 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นกลีบ รูปกลม กว้างยาวประมาณ  
0.2 เซนติเมตร สีแดงทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ยาวประมาณ 1.6 เซนติเมตร ก้านเกสรสี  
เหลือง ติดที่โคนของหลอดกลีบดอก อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 2 ช่อง รังไข่  
หนึ่งองกลีบ ยาวประมาณ 1.6 เซนติเมตร รังไข่สีแดงโคนสีเขียว ก้านเกสรสีแดง ยอดเกสรเรียวยาว  
แหลมมีรูเปิด พลาเซนทารอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง

ชื่อ                    ประทัดจีน  
ชื่อวิทยาศาสตร์    *Quassia amara* L.  
ชื่อพ้อง             -  
ชื่อวงศ์             Simaroubaceae  
ชื่ออื่นๆ            ประทัด, ปิง  
ชื่อภาษาอังกฤษ    Quassia, Stave-wood, Surinam quassia wood

ไม้พุ่ม สูง 1.5-2 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล มีรอยแตกเป็นทางยาว แตกกิ่งใกล้โคนต้น ใบประกอบ  
แบบขนนกปลายคู่ ออกเวียนสลับ ใบย่อยจำนวน 6 ใบ ก้านใบและแกนกลางใบมีปีก ก้านใบยาว 5-  
8 เซนติเมตร สีแดง โคนพองเป็นเนื้อหนา ใบย่อย รูปไข่กลับ กว้าง 1-2.3 เซนติเมตร ยาว 3-6.5  
เซนติเมตร โคนรูปลิ้น ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบหนา ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม ด้านท้องใบสีเขียว  
อ่อนกว่า เส้นกลางใบสีแดง ดอกช่อกระจุก ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกไม่มี แกนช่อดอกสีแดง ดอก  
ย่อยสีแดงเข้ม เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีแดง จำนวน 5 กลีบ  
ขนาดเล็ก รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร มีขนที่ขอบ โคจรอบ กลีบดอกสีแดง จำนวน 5  
กลีบ รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.5-0.7 เซนติเมตร ยาว 2.5-3 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ จำนวน 10 อัน ยาว  
2.5-3 เซนติเมตร ก้านชูอับเรณูสีแดง โคนก้านแผ่กว้าง มีขนสีขาว อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย  
ประกอบด้วย 5 พู 5 ช่อง แยกเป็นอิสระ รังไข่หนึ่งองกลีบ ก้านเกสรสีแดง จำนวน 1 อัน ยอดเกสร  
เรียวยาวแหลมมีรูเปิด พลาเซนทารอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง

ชื่อ                    ตำโพง  
ชื่อวิทยาศาสตร์    *Datura metel* L. var. *metel*  
ชื่อพ้อง             -  
ชื่อวงศ์             Solanaceae  
ชื่ออื่นๆ            มะเขือบ้า, ตำโพงขาว, มั่ง โด๊ะ โด๊ะ, ละอังกะ, เลี้ยก  
ชื่อภาษาอังกฤษ    Thorn apple

ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ลำต้นสีเทาอ่อน แตกกิ่งใกล้โคนต้นแผ่บานออก เป็นพุ่มโปร่ง ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบยาว 6-12 เซนติเมตร มีจุดสีน้ำตาล แผ่นใบรูปรี กว้าง 8-14 เซนติเมตร ยาว 19.5-29.5 เซนติเมตร โคนเฉียง ปลายเรียวแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อยแบบไม่เป็นระเบียบ เนื้อใบหนาแน่น ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีขน เส้นใบชัดเจน ดอกเดี่ยวมีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีส้ม สีชมพู และสีม่วง ออกที่ซอกก้านใบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตร รูปปากแตร ห้อยคอกลงดิน ก้านดอกสีเขียว ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปหลอด ยาว 15-16 เซนติเมตร ปลายเว้าเป็น 5 แฉก ด้านนอกมีขน กลีบดอกรูปปากแตร ยาว 30-35 เซนติเมตร ปลายเว้าแหลม กลีบดอกพับเป็นจีบ สันของจีบเรียวแหลมเป็นหางยาว ขอบเรียบ เนื้อบาง เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 9 เซนติเมตร ก้านเกสรสีน้ำตาล เชื่อมติดกับกลีบดอกด้านในตรงกลางแตร อับเรณูด้านนอกสีเหลืองอ่อน ด้านในสีน้ำตาล ละอองเรณูสีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 24 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉกประกบกัน ข้างนอกสีขาว ข้างในสีน้ำตาล พลาเซนทารอบแกนร่วม ผลชนิดสด แบบผลแดง สีเขียว มีหนามแหลมยื่นขึ้นมาเหนือเปลือก

ชื่อ มะแว้งคัน  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Solanum indicum* L.  
 ชื่อพ้อง  
 ชื่อวงศ์ Solanaceae  
 ชื่ออื่นๆ แว้งคม, สะกั้งแค, หมากแอ้งตง, มะแคว้ง, มะแคว้งขม, มะแคว้งดำ, มะแว้ง, มะแคว้งคม

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ลำต้นสีเขียว แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มแน่น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบยาว 2-4 เซนติเมตร แผ่นใบรูปทรงกลม กว้าง 4.5-10 เซนติเมตร ยาว 4.5-11 เซนติเมตร โคนเฉียง ปลายแหลม ขอบหยักเว้า เนื้อใบหนาแน่น ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม มีขนรูปดาว ด้านท้องใบสีเขียวอ่อนกว่า เส้นใบชัดเจน มีขนรูปดาว หนาแน่น ดอกช่อเชิงหลั่น ออกตามกิ่ง ก้านช่อดอกไม่มี ดอกย่อยสีม่วงอ่อน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปถ้วย มีขนรูปดาวปลายเว้าเป็น 5 แฉก ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีขนที่ขอบโดยรอบ ติดทนถึงผล กลีบดอกสีม่วง จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกรูปรี กว้าง 0.7-0.8 เซนติเมตร ยาว 0.7-1 เซนติเมตร ด้านบนและล่าง มีขนรูปดาวเบาบาง เนื้อบาง เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ก้านเกสรเชื่อมติดกัน อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ก้านเกสร จำนวน 1 อัน ยอดเกสรเรียวแหลมมีรูเปิด พลาเซนทารอบแกนร่วม ผลสด มีเนื้อหลายเมล็ด รูปกลมเมื่อแก่มีสีส้มสด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1 เซนติเมตร

พองสมุทร

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Duranta repens* L.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Verbenaceae

ชื่ออื่นๆ เทียนหยด, เครืออ่อน, พวงม่วง, สาวบ่อดล

ชื่อภาษาอังกฤษ Golden dewdrop, Pigeon-berry, Sky-flower

ไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยมสีน้ำตาล มีรูช่องอากาศเป็นจุดสีน้ำตาล มีขน แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มแน่น ใบเดี่ยวออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร โคนก้านของหนา มีขน แผ่นใบ รูปรี กว้าง 1.3-2.5 เซนติเมตร ยาว 3-6 เซนติเมตร โคนสอบเรียว ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบบาง ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีขนเบาบาง ดอกช่อกระจุก ออกที่ปลายกิ่งและซอกก้านใบใกล้ ๆ ยอด ก้านช่อดอกยาว 0.5-1 เซนติเมตร ช่อดอกยาว 3-5 เซนติเมตร สีม่วง ดอกย่อยสีม่วง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว จำนวน 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายจักแหลม ยาวประมาณ 0.1 เซนติเมตร ด้านนอกมีขน ขยขนาดตามการเจริญของผล ติดทนถึงผลแก่และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลีบดอกสีม่วง จำนวน 5 กลีบ รูปกรวย โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ สีเขียว ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นกลีบในแนวระนาบตั้งฉากกับหลอด สีขาวและม่วง รูปกลม กว้างยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร มีขนเกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ยาวสองขนาดคือ 0.5 และ 1 เซนติเมตร ก้านชูอับเรณูสีขาว อับเรณูสีขาว เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 5 ช่อ รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเขียว ยอดเกสรเป็นก้อนสีเขียว พลาเซนทารอบแกนร่วม ผลชนิดสด มีเนื้อหลายเมล็ด รูปกลมรี กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สีเหลืองเมื่อแก่

ชื่อ ผกากรอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lantana camara* L.

ชื่อพ้อง *L. aculeata* L.

ชื่อวงศ์ Verbenaceae

ชื่ออื่นๆ กำมั่ง, เบญจมาศป่า, ขะจาย, ตาปู, มะจาย, ชีกา, คำขี้ไก่, ดอกไม้จีน, เบ็งละมาศ, สาบแรง, ไม้จีน, ยี่สุ่น, สามสิบ, หญ้าสาบแรง

ชื่อภาษาอังกฤษ Cloth of gold, Hedge flower

ไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ต้นเป็นเหลี่ยมสีน้ำตาล มีขน แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มแน่น มีกลิ่นฉุนรุนแรง ใบเดี่ยวออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร มีขน แผ่นใบ รูปไข่ กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 2.5-5 เซนติเมตร โคนมน ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อยละเอียด เนื้อใบคายมือ

ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีขนเบาบางแต่หนาแน่นที่เส้นใบ เส้นใบชัดเจน ดอกช่อเชิง  
 หล่น มีหลายสี ได้แก่ สีขาว เหลือง แดง ชมพู ส้ม ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาว 2.5-3  
 เซนติเมตร มีขน ดอกย่อย เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว จำนวน  
 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด กว้างประมาณ 0.1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร ด้านอกมี  
 ขน ปลายจักแหลม กลีบดอกหลายสี จำนวน 5 กลีบ รูปกรวย โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ สีเขียว  
 ยาวประมาณ 1.6 เซนติเมตร ด้านนอกมีขน ปลายแยกเป็นกลีบในแนวระนาบตั้งฉากกับหลอด รูป  
 ไข่กลับหรือกลม กว้าง 0.2-0.6 เซนติเมตร ยาว 0.2-0.3 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ยาวเท่า  
 กันคือ 0.3 เซนติเมตร แต่ติดที่หลอดของกลีบสูงต่ำต่างกันเป็นสองระดับ ก้านเกสรสีขาว อับเรณูสี  
 เหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 2 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 0.35 เซนติเมตร สี  
 เขียวมีขน ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรสีเขียวพองออกเล็กน้อย พลาเซนตาที่ฐาน ผลชนิดสด มีเนื้อ  
 หลายเมล็ด รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร เมื่อแก่สีดำ

ไม้ล้มลุก (HERB)

ชื่อ ฟ้าทะลายโจร

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Andrographis paniculata* (Burm.f.) Wall. ex Nees

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Acanthaceae

ชื่ออื่นๆ ฟ้าทะลาย, หญ้ากันงู, น้ำลายพังพอน, ชีปังกี

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 1 เมตร ลำต้นเหลี่ยม สีเขียว แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มตั้งขึ้น ใบเดี่ยว  
 ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบไม่มี แผ่นใบรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 4-7  
 เซนติเมตร โคนสอบเรียว ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่า  
 ด้านท้องใบ ผิวเกลี้ยง ดอกช่อเดี่ยว สีขาวอมเขียว ออกที่ซอกก้านใบใกล้ๆ ยอด ก้านช่อดอกยาว  
 1-3 เซนติเมตร ดอกย่อย สีขาวจุดสีม่วง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง  
 สีเขียว จำนวน 5 กลีบ รูปถ้วย ปลายแหลม แยกเล็กเกือบถึง โคน ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ด้านใน  
 เกลี้ยง ด้านนอกมีขนสีขาวปลายเป็นคุ่มสีม่วง ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอก รูปปากเปิด จำนวน 5 กลีบ  
 แบ่งเป็น 3 กับ 2 ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร โคนเชื่อม เนื้อกลีบบาง ด้านในสีขาวมีจุดสีม่วงใกล้ๆ  
 ปากเปิด ด้านนอกสีขาว มีเส้นสีม่วงจากปลายถึงโคน มีขนสีขาวปลายเป็นคุ่มสีม่วง เกสรเพศผู้  
 จำนวน 2 อัน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาวมีขน อับเรณูสีม่วงเข้ม ก้านเกสรเชื่อมติด  
 กันและติดที่หลอดกลีบดอกใกล้ปากเปิด เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 2 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ  
 ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร รังไข่สีม่วงเข้ม มีขนสีขาวปลายเป็นคุ่มสีม่วงหนาแน่น ยอดเกสรเรียว

แหลม พลาเซนตาติครอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง เป็นฝักกลมรี ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร แตกกลางตะเข็บ

ชื่อ หงอนไก่ไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Celosia argentea* L.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Amaranthaceae

ชื่ออื่นๆ ดอกค้าย, หงอนไก่, พอคอที, หงอนไก่คอง, หงอนไก่ไทย, หงอนไก่ฟ้า, หงอนไก่คอกกลม, หงอนไก่ฝรั่ง, กระจลารอน, ซองฟู, ซองฟู, ค้ายสร้อย, สร้อยไก่

ชื่อภาษาอังกฤษ Cocks comb

ไม้ล้มลุกฤดูเดียว สูงประมาณ 1 เมตร ลำต้นเหลี่ยมเป็นร่อง สีเขียวปนแดง แตกกิ่งใกล้โคนต้นเป็นพุ่มตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบสีแดง ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 4.5-8.5 เซนติเมตร โคนสอบเรียว ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบบางเนียน ด้านหลังใบสีเขียวด้านท้องใบสีแดง ดอกช่อเชิงลดแยกแขนง สีแดง ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกประมาณ 2 เซนติเมตร ดอกย่อย สีแดง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง จำนวน 3 กลีบ รูปไข่ กว้างประมาณ 0.15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม เนื้อบางใสแห้ง กลางกลีบมีขีดสีแดง 1 เส้น กลีบดอก จำนวน 5 กลีบ รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 0.25 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร โค้งรูปท้องเรือ เนื้อกลีบบางใสแห้ง ตรงกลางมีแถบสีแดง เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร โคนก้านเกสรเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยโอบรอบรังไข่ ส่วนปลายสอบเรียวเป็นก้านสั้นๆ อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 1 ช่อ รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร สีเขียว ก้านเกสรสีแดง ยอดเกสรสีเหลือง พองเป็นคุ่ม พลาเซนตาติคที่ฐาน ผลชนิดแห้ง แตกแบบฝาเปิด เมล็ดสีดำเป็นเงามัน

ชื่อ บานไม่รู้โรย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gomphrena globosa* L.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Amaranthaceae

ชื่ออื่นๆ กะล่อม, ตะล่อม, ดอกสามเดือน

ชื่อภาษาอังกฤษ Globe amaranth, Bachelor's button

ไม้ล้มลุกฤดูเดียว สูง 1.5-0.6 เมตร ลำต้นกลมเขียว มีขนสั้นสีขาวหนาแน่น แตกกิ่งมากใกล้โคนต้น เป็นพุ่มกลม ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบไม่มี แผ่นใบรูปใบหอก รูปขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 2.5-10 เซนติเมตร โคนมน ปลายแหลม

ขอบเรียบ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ดอกช่อกระจุกแน่นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร มีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีแดงอมม่วง สีชมพู สีส้ม ออกที่ซอกใบใกล้ยอด แต่ละช่อดอกมีใบประดับ 2 ใบ ก้านช่อดอกยาว 5-8 เซนติเมตร ดอกย่อย กลีบรวม จำนวน 5 กลีบ เรียงเหลื่อมซ้อนกัน ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร เนื้อกลีบแห้ง คัดหนถึงผลแก่ เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 1 พู 1 ช่อ รังไข่เหนือวงกลีบ พลาเซนตาติดที่ฐาน ผล รูปไข่แกมขอบขนาน เมล็ดแบนสีน้ำตาลเป็นมัน

ชื่อ ผักแพ้วแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Iresine herbstii* Hook.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Amaranthaceae

ชื่ออื่นๆ ผักแพ้วสวน, อีแปะ, ผักแพ้วแดง, ละอองใบค้าง

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 0.5-1 เมตร ลำต้นสีแดงเป็นร่อง มีขนสีขาวกระจายห่างๆ แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มตั้งชัน ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบสีแดง มีขนสีขาวกระจายห่างๆ ยาว 1-3 เซนติเมตร แผ่นใบรูปกลม กว้างและยาว 4-5 เซนติเมตร โคนตรง ปลายเว้ารูปหัวใจกลับ ขอบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม ด้านท้องใบสีแดง มีขนสีขาวกระจายห่างๆ เส้นใบสีแดงชัดเจน ดอกช่อกระจุกแยกแขนง สีขาว ออกที่ซอกก้านใบใกล้ๆ ยอด ก้านช่อดอกสีแดง มีขนสีขาว ยาว 2.5-5 เซนติเมตร ดอกย่อย สีขาว ไม่มีก้านดอกย่อย กลีบเลี้ยง จำนวน 3 กลีบ รูปไข่ กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.1 เซนติเมตร เนื้อบางโปร่งใส กลีบดอก จำนวน 5 กลีบ รูปไข่ กว้างประมาณ 0.05 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.1 เซนติเมตร เนื้อกลีบบางใส ด้านหลังมีขน เกสรเพศผู้ไม่มี เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 1 พู 1 ช่อ รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 0.1 เซนติเมตร สีเขียวใส ยอดเกสรแยกเป็นสองแฉก มีขนสั้นๆ เป็นพู่ พลาเซนตาติดที่ฐาน ผลชนิดแห้ง

ชื่อ พลับพลึง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Crinum asiaticum* L.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Amaryllidaceae

ชื่ออื่นๆ ลิลาว

ชื่อภาษาอังกฤษ Cape lily, Crinum lily

ไม้ล้มลุกอายุหลายฤดู สูง 0.5-1 เมตร มีหัวใต้ดิน ส่วนเหนือดินประกอบด้วยกาบใบสีขาว หุ้มซ้อนกันเป็นชั้น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับเป็นวง ก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มซ้อนกันคล้ายเป็นดิน แผ่น

ใบรูปขอบขนานยาว กว้าง 7-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร โคนแผ่เป็นกาบ ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบหนาอวบน้ำ ด้านหลังใบและด้านท้องใบสีเขียวอ่อน ผิวเรียบ กลางใบเป็นร่อง ดอกช่อซี่ร่มขนาดใหญ่ สีขาว ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกหนา อวบน้ำ ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร มีใบประดับ 2 ใบห่อหุ้มช่อดอกและติดทนถึงดอกโรย ดอกย่อยสีขาว เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร กลีบรวมสีขาว จำนวน 6 กลีบ ยาว 16-22 เซนติเมตร โคนเชื่อมเป็นหลอดแคบ ยาว 7-10 เซนติเมตร สีเขียว ปลายแยกเป็นแฉกลีกรูปขอบขนาน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร สีขาว เนื้อกลีบหนา มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เกสรเพศผู้ จำนวน 6 อัน ยาว 8-10 เซนติเมตร ก้านเกสรสีแดง โคนสีขาว อับเรณูสีม่วงเข้มติดตรงกลาง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อง รังไข่โค้งกลับ เป็นสันสามเหลี่ยม สีเขียวเป็นมันเกลี้ยง ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ก้านเกสรแทงขึ้นเหนือหลอดกลีบดอก ยาว 14-20 เซนติเมตร ยอดเกสรเป็นรูเปิด พลาเซนตาติดรอบแกนร่วม ผลชนิดสด

ชื่อ                    พลับพลึงดินเป็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์   *Hymenocallis littoralis* Salisb

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์             Amaryllidaceae

ชื่ออื่นๆ

ชื่อภาษาอังกฤษ Spider lily

ไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดิน สูง 0.5-0.75 เมตร แดกใบเป็นกระจุกแน่น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มซ้อนกันคล้ายเป็นคัน แผ่นใบรูปขอบขนานยาว กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร โคนแผ่เป็นกาบ ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบหนา ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ผิวเกลี้ยง กลางใบเป็นร่อง ดอกช่อซี่ร่ม สีขาว ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกหนา อวบน้ำ ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร มีใบประดับ 2 ใบห่อหุ้มช่อดอกและติดทนถึงดอกโรย ดอกย่อยสีขาว เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงไม่มี กลีบดอกสีขาว จำนวน 6 กลีบ ยาว 16-22 เซนติเมตร โคนเชื่อมเป็นหลอดแคบ ยาว 7-10 เซนติเมตร สีเขียว ปลายแยกเป็นแฉกลีกรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง 0.5-0.7 เซนติเมตร ยาว 9-10 เซนติเมตร สีขาว เนื้อกลีบหนา เกสรเพศผู้ จำนวน 6 อัน ยาว 6-9 เซนติเมตร โคนก้านเกสรแผ่เป็นแผ่นเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย สีขาว ปลายเป็นก้านสีเขียว ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร อับเรณูสีเหลืองเข้มติดตรงกลาง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อง รังไข่โค้งกลับ เป็นสันสามเหลี่ยม สีเขียวเป็นมันเกลี้ยง ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ก้านเกสรแทงขึ้นเหนือหลอดกลีบดอก ยาว 14.5-22 เซนติเมตร ยอดเกสรพองหนาเป็นคุ่ม สีเขียว มีน้ำเหนียว พลาเซนตาติดที่ฐาน

ชื่อ **แพงพวยฝรั่ง**  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Catharanthus roseus* (L.) G.Don  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Apocynaceae  
 ชื่ออื่นๆ นมอิน, ผักปอดบก, แพงพวยบก

ชื่อภาษาอังกฤษ Vinca, Pinkle-pinkle, Pink periwinkle, Cape periwinkle, Bright eye, West indian periwinkle, Madagascar periwinkle

ไม้ล้มลุกหลายฤดู สูง 0.5-0.75 เมตร ลำต้นกลม มียางใส แดกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบ ยาว 1-1.2 เซนติเมตร แผ่นใบรูปรีถึงรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 6-8.5 เซนติเมตร โคนมน ปลายเป็นติ่งแหลม ขอบเรียบ ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม ก้านดอกใบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน เส้นกลางใบสีเขียวชัดเจน ดอกช่อออกเป็นคู่ที่ซอกก้านใบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5-5 เซนติเมตร ดอกย่อย สีขาวหรือสีม่วงแดง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5-5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียว จำนวน 5 กลีบ ลักษณะเป็นเส้นสีเขียวอวบน้ำ ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอก รูปดอกเข็ม หลอดกลีบยาวประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร ปลายแยกแผ่บาน จำนวน 5 กลีบ รูปกลม กว้างและยาว 2.5-3 เซนติเมตร ปลายกลีบเป็นติ่งแหลม เนื้อกลีบบาง เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ไม่มีก้านเกสร อับเรณูสีเหลืองติดที่ส่วนปลายของหลอด เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 2 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ สีเขียว ยอดเกสรพองเป็นค้อน สีเขียวใส มีน้ำเหนียว พลาเซนตาติดที่ขอบแนวเดียว ผลชนิดแห้ง เป็นฝัก ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร แดกคามรอยตะเข็บข้างเดียว

ชื่อ **เขี้ยวหมื่นปี**  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Aglaonema modestum* Schott  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Araceae  
 ชื่ออื่นๆ -

ชื่อภาษาอังกฤษ Ribbon aglaonema

ไม้ล้มลุกอายุหลายฤดู สูง 0.3-0.5 เมตร ลำต้นกลม ข้อถี่ ลำต้นใกล้โคนทอคนอน ใบหนาแน่น โกล่ขด มียางใส ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบค่อนบนกลม ส่วนโคนก้านแผ่เป็นปีกหุ้มต้น แผ่นใบรูปใบหอก กว้างประมาณ 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร โคนรูปลิ้ม ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบหนา ด้านหลังใบสีเขียวมีรอยด่างสีขาวเป็นแต้มหรือปื้นออกจากเส้นกลางใบ ผิวใบเกลี้ยง ด้านท้องใบสีอ่อนกว่า เส้นใบอวบน้ำ ดอกช่อเชิงลด ใบประดับสีขาวอมเขียว 1 ใบ รองรับช่อดอก ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาว 6-8 เซนติเมตร ดอกย่อยแยกเพศอยู่ในช่อดอกเดียว

ล้ม ดอกย่อยเพศผู้อยู่ส่วนปลายของช่อดอก สีขาวนวล ดอกย่อยเพศเมียอยู่ส่วนโคน เกสรเพศเมีย รั้ง  
ใบเหนือวงกลีบ ผลสด กลม

ชื่อ นางพญาหงสา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dieffenbachia daguensis* Engl.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Araceae

ชื่ออื่นๆ ว่านหงสาวดี

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกหลายฤดู สูง 0.5-1 เมตร ลำต้นสีเขียว หุ้มด้วยกาบใบ มียางใสและมีกลิ่น ใบเดี่ยว  
ออกเวียนสลับ ก้านใบกลม เป็นร่องด้านใน โคนก้านเป็นสันมีปีกยื่นขึ้นมาหุ้มต้น ยาวประมาณ 10  
เซนติเมตร แผ่นใบรูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ กว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 41  
เซนติเมตร โคนรูปลิ้น ปลายแหลมเป็นติ่ง ขอบเรียบ เนื้อใบหนา ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้อง  
ใบ เส้นกลางใบหนาอวบนำชัดเจน ผิวใบเกลี้ยง เส้นใบเรียงขนานออกจากเส้นกลางใบ ดอกช่อเชิง  
ลด ใบประดับสีเขียวม้วนห่อส่วนโคนก้านดอก ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 4  
เซนติเมตร อวบหนา มียางใสกลิ่นเหม็น ดอกย่อยแยกเพศอยู่ในช่อดอกเดียวกัน กาบหุ้มช่อดอก สี  
เขียว รูปไข่ กว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร โคนห่อม้วนหุ้มช่อดอก ปลาย  
เป็นติ่งแหลม เนื้อหนาอวบ หลังดอกบานจะหุ้มช่อดอกทั้งหมดไว้ภายใน ดอกย่อยเพศผู้อยู่ส่วน  
ปลายของช่อดอก สีขาว รูปหกเหลี่ยมฝัองอยู่บนแกนช่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกไม่มี เกสรเพศผู้  
จำนวน 10 อัน อับเรณูสีขาว ดอกย่อยเพศเมียอยู่ส่วนโคนของช่อดอก สีขาว รูปหกเหลี่ยม ฝัองอยู่บน  
แกนช่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกไม่มี เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 2 ช่อง รั้งไข่เหนือวงกลีบ  
ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร รั้งไข่สีเขียว ยอดเกสรสีเหลืองเป็นกระจุกเนื้อเชื่อมชุ่มน้ำ พลาเซนตาติด  
ที่ฐาน

ชื่อ ว่านหมื่นปี

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dieffenbachia seguine* (Jacq.) Schott var. *seguine*

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Araceae

ชื่ออื่นๆ สาวน้อยประแป้ง, ช้างเผือก, ว่านพญาค่าง, อ้ายใบ้ก้านขาว, บัววันนี้แชน

ชื่อภาษาอังกฤษ Dumb cane

ไม้ล้มลุกหลายฤดู สูง 1-1.5 เมตร ลำต้นกลม ข้อถี่ ลำต้นใกล้โคนทอคนอน ใบหนาแน่นใกล้  
ยอด มียางใส ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบกลม เป็นร่องด้านใน โคนก้านเป็นสันมีปีกยื่นขึ้นมาหุ้ม

แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 18 เซนติเมตร ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร โคนรูปมน ปลายแหลมเป็นติ่ง ขอบเรียบ เนื้อใบหนา ด้านหลังใบสีเขียวมีรอยด่างสีขาวเป็นแฉกหรือขีดออก ตกเส้นกลางใบ ผิวใบเกลี้ยง ด้านท้องใบสีอ่อนกว่า เส้นใบอวบหนา เป็นเส้นขนานออกจากเส้น กลางใบ ดอกช่อเชิงลด ใบประดับสีเขียวมีวุ้นห่อส่วนโคนก้านดอก ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอก ยาว 8-10 เซนติเมตร ดอกย่อยแยกเพศอยู่ในช่อดอกเดียวกัน ดอกย่อยเพศผู้อยู่ส่วนปลายของช่อดอก สีขาว เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.2 เซนติเมตร รูปหกเหลี่ยม ฝักอยู่บนแกนช่อดอก กลีบ เลี้ยงและกลีบดอกไม่มี เกสรเพศผู้ จำนวน 3 อัน ก้านเกสรเป็นแผ่นสีขาวเชื่อมติดกันเป็นรูปหก เหลี่ยม อับเรณูสีขาวติดที่มุมหกเหลี่ยมของก้านเกสร ดอกย่อยเพศเมียอยู่ส่วน โคนของช่อดอก สีส้ม และสีขาว เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.7 เซนติเมตร รูปหกเหลี่ยม ฝักอยู่บนแกนช่อดอก กลีบเลี้ยงไม่มี กลีบดอกสีขาว จำนวน 3 กลีบ รูปไข่กลับ กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาว ประมาณ 0.4 เซนติเมตร เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 1 ช่อ รังไข่เหนือวงกลีบ กว้างและยาว ประมาณ 0.3 เซนติเมตร รังไข่สีเขียว ยอดเกสรสีส้มเป็นกระจุกเนื้อเยื่อชุ่มน้ำ พลาเซนตาติดที่ฐาน

ชื่อ                    เหนือลิ้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Spathiphyllum floribundum* N.E.Br.

ชื่อท้องถิ่น

ชื่อวงศ์             Araceae

ชื่ออื่นๆ

ชื่อภาษาอังกฤษ

ไม้ล้มลุกหลายฤดู สูง 0.5-1 เมตร ลำต้นใต้ดิน แดกใบเป็นกระจุกซ้อนกันที่โคนต้น มียางใส ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับซ้อนกันที่โคนต้น ก้านใบกลม ยาว 40-50 เซนติเมตร โคนก้านใบแผ่เป็นกาบ หุ้มใบถัดไป แผ่นใบรูปรี กว้าง 15-20 เซนติเมตร ยาว 35-40 เซนติเมตร โคนเฉียง ปลายมน ขอบ เรียบ เนื้อใบบางเหนียว ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ผิวใบเกลี้ยง เส้นใบแบบขนานออก จากเส้นกลางใบ ดอกช่อเชิงลดมีกาบ ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 70 เซนติเมตร มี ยางใส กาบหรือใบประดับรูปรี กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 17-20 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนรูปกลม เนื้อใบหนาเหนียว ด้านบนสีขาว ด้านล่างสีเขียว เส้นใบชัดเจน ดอกย่อย สีขาว รูปหกเหลี่ยมฝักอยู่ บนแกนช่อดอก เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงไม่มี กลีบดอกรูปถ้วย เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ติดที่มุมฐานของรังไข่ ก้านเกสรสีขาว อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 1 ช่อ รังไข่เหนือวงกลีบ ยอดเกสรเป็นรูเปิด พลาเซนตาติดที่ฐาน ผลแห้ง หนึ่ง ผลต่อหนึ่งเมือด ผลไม้แตก

ชื่อ ว่านหางจระเข้  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Aloe vera* (L.) Burm.f.  
 ชื่อห้อง -  
 ชื่อวงศ์ Asphodelaceae  
 ชื่ออื่นๆ ว่านไฟไหม้, หางตะเข้

ชื่อภาษาอังกฤษ Barbados aloe, Curacao aloe, Unguentine cactus, Star cactus, Aloe, Aloin Jafferabad, Barbados

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 0.5 เมตร ลำต้นอวบน้ำ สีเขียว มียางใส ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก เป็นกระจุกแน่นเหนือดิน ก้านใบไม่มี แผ่นใบรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 25-40 เซนติเมตร โคนแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแหลม ขอบเป็นหนามจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบหนาอวบน้ำตรงกลางเป็นวุ้น ด้านหลังใบสีเขียวมีรอยค่างจุดสีขาวกระจายโดยทั่ว ผิวเกลี้ยง ดอกช่อเชิงลด สีส้มปนเขียว ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ดอกย่อย สีส้มปนเหลือง รูปปากเปิด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.3 เซนติเมตร ดอกห้อยหัวลง ก้านดอกอวบหนา สีเขียว ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีส้มมีลายเส้นสีเขียว จำนวน 3 กลีบ รูปปากเปิด ปลายมน กว้างประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบดอก สีเหลือง รูปปากเปิด จำนวน 3 กลีบ แบ่งเป็น 2 กับ 1 กว้างประมาณ 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ จำนวน 6 อัน มีสองขนาด ต้น 1 คู่ ยาว 2 คู่ ยาว 2.5-3 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเหลือง อับเรณูสีน้ำตาล เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 6 พู 3 ช่อ รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 2.8 เซนติเมตร สีเขียว ขอดเกสรแหลม พลาเซนตาติครอบแกนร่วม

ชื่อ ข้ำหลวงหลังลาย  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Asplenium nidus* L. var. *nidus*  
 ชื่อห้อง -  
 ชื่อวงศ์ Aspleniaceae  
 ชื่ออื่นๆ กระแตไต่หิน, กระปรอกหัวลง, กระปรอกหางสิงห์, ช้องนาง, หางนกยูง, หางนกหว้า, หางสิงห์

ชื่อภาษาอังกฤษ Bird's nest fern

ไม้ล้มลุกประเภทเฟิร์น ลำต้นใต้ดิน แตกใบเป็นกระจุกแผ่บานออก ใบอ่อนมีวุ้นเข้าหาแกนกลาง ใบเดี่ยว ขนาดใหญ่ แผ่นใบรูปรียาว กว้าง 7-10 เซนติเมตร ยาว 45-60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่นหยักช่วย ใบแก่ด้านหลังใบมีอับสปอร์สีน้ำตาล เป็นเส้นขนานออกจากเส้นกลางใบไปยังขอบใบ เส้นกลางใบสีน้ำตาลดำ

ชื่อ เทียนดอก  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Impatiens balsamina* L.  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Balsaminaceae  
 ชื่ออื่นๆ เทียนบ้าน, เทียนไทย, เทียนสวน  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Garden balsam

ไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียว สูง 0.5- 1 เมตร ลำต้นสีเขียว มีขนสีขาวยาวหนาแน่น ค่อนข้างอวบน้ำ มีขนกระจายห่างๆ แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ค่อนข้างอวบน้ำ แผ่นใบรูปรี กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 8-11.5 เซนติเมตร โคนสอบเรียว ปลายเรียวแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบบาง ด้านหลังใบและด้านท้องใบสีเขียว ผิวใบเกลี้ยง ดอกช่อกระจุกด้านเดียว มีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีแดง สีม่วงและสีชมพู ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกไม่มี ดอกย่อย เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร อวบน้ำ มีขนสีขาวยาว กว้างประมาณ 2 กลีบ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร บางใส มีเส้นสีเขียวตรงกลาง เกลี้ยง กลีบดอก รูปปากเปิด จำนวน 6 กลีบ มี 3 แบบ รูปเคียว 1 กลีบ 4 กลีบที่เหลือจับคู่กันเป็น 2 คู่ โดยมีก้านเชื่อมติดกัน ยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร อีก 1 กลีบเป็นปากเปิด ยาวประมาณ 1.1 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.6 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาวแยกเป็นอิสระ อับเรณูสีขาวเชื่อมติดกันเป็นวงล้อมยอดเกสรเพศเมีย เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 5 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร สีเขียว ยอดเกสรสีขาวปลายเปิด พลาเซนตาติครอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง แตกตามแนวตะเข็บด้านเดียว

ชื่อ เทียนฝรั่ง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Impatiens wallerana* L.  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Balsaminaceae  
 ชื่ออื่นๆ -  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Busy lizzie

ไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียว สูง 0.3-0.5 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกเป็นวง ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สีน้ำตาลแดง ค่อนข้างอวบน้ำ แผ่นใบรูปรี กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตร โคนรูปกลม ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม ด้านท้องใบสีน้ำตาลแดง ดอกเดี่ยว มีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีแดง สีม่วง สีชมพูและสีส้ม ออกที่ซอกก้านใบใกล้ยอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 เซนติเมตร ก้านดอก

ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร กลมเกลี้ยง ก่อนข้างอวบน้ำ กลีบเลี้ยง จำนวน 2 กลีบ รูปรี มีสองขนาด กลีบเล็ก กว้างประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.9 เซนติเมตร กลีบใหญ่ กว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร โคนสอบเรียวเป็นหางยาวประมาณ 5 เซนติเมตร กลีบดอก จำนวน 5 กลีบ มี 2 แบบ เชื่อมติดกันที่โคน 2 คู่ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร อีก 1 กลีบเป็นอิสระ รูปค่อนข้างกลม กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาว 2.5-3 เซนติเมตร ปลายเว้ารูปหัวใจกลับ ด้านท้องกลีบเป็นสัน เนื้อหนานุ่ม สีสดใส เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ก้านเกสรสีแดงแยกเป็นอิสระ อับเรณูสีขาวเชื่อมติดกันเป็นวงล้อม ยอดเกสรเพศเมีย เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร ยอดเกสรสีน้ำตาลแยกเป็น 5 แฉก พลาเซนตาติครอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง แตกตามแนวตะเข็บ

ชื่อ ปืบฝรั่ง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Laurentia longiflora* (L.) Petern.  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Campanulaceae  
 ชื่ออื่นๆ แสนประสะ  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกอายุหลายฤดู สูงประมาณ 0.5 เมตร แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบไม่มี ก่อนข้างอวบน้ำ แผ่นใบรูปรีขอบขนาน กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 7-8 เซนติเมตร โคนรูปลิ้น ปลายแหลม ขอบหยักซี่ฟัน เนื้อใบบาง ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ เส้นกลางใบอวบน้ำ เส้นใบชัดเจน ดอกเดี่ยว สีขาว ออกที่ซอกใบ ก้านดอกยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีขนสีขาวหนาแน่น เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียว รูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก มีเส้นสันตามแนวแฉก ขอบหยักเป็นฟันเลื่อย ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ด้านนอกมีขนสีขาวหนาแน่น กลีบดอก สีขาวเป็นหลอด ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบตั้งฉากกับหลอด รูปรี ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร กว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร ขอบเป็นคลื่น ด้านนอกมีขนสีขาว เนื้อบาง เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาวแยกเป็นอิสระ อับเรณูสีเหลืองเชื่อมติดกัน ปลายอับเรณูมีขนสีขาวยาว เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 2 ช่อง รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ ก้านเกสรยาวประมาณ 6 เซนติเมตร สีเขียว ยอดเกสรพองหนา มีขนสีขาว พลาเซนตาติครอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง ไม้แตก

ชื่อ พุทธรักษา  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Canna hybrid*  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Cannaceae  
ชื่ออื่นๆ บัวหลวง, พุทธร, ปลียะ  
ชื่อภาษาอังกฤษ Indian shot

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 2 เมตร ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า แดงใบชูตั้งขึ้นเป็นพุ่ม ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบเป็นกาบ เรียงซ้อนกันคล้ายคัน อวบน้ำ แผ่นใบรูปรี กว้าง 12-16 เซนติเมตร ยาว 25-40 เซนติเมตร โคนสอบเรียว ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ด้านหลังใบและ ด้านท้องใบสีเขียวเข้มหรือสีแดงเข้มอมดำ เส้นกลางใบอวบน้ำ ผิวใบมีนวลขาว ดอกช่อกระจุกด้าน เดี่ยวซ้อน สีแดง ออกที่ซอกใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 35 เซนติเมตร มีใบประดับ 2 ใบหุ้มช่อดอก รูปรี กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร โค้งรูปท้องเรือ เนื้อหนาเหนียว ดอกย่อย เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร โคนก้านดอกมีใบประดับ 3 ใบ ขนาดไม่เท่ากัน ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง จำนวน 3 อัน ขนาดไม่เท่ากัน รูปสามเหลี่ยม โค้งเป็นท้องเรือ ปลายแหลม กว้าง 0.4-0.5 เซนติเมตร ยาว 1-1.3 เซนติเมตร เนื้อบาง เหนียว ติดทนถึงผล กลีบดอก จำนวน 3 กลีบ เหมือนกลีบเลี้ยง กว้าง 0.5-0.8 เซนติเมตร ยาว 5.5-5.6 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ จำนวน 6 อัน เปลี่ยนเป็นแผ่นเสมือนเป็นกลีบดอกสีต่างๆ กว้าง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 8.5-9 เซนติเมตร อับเรณูสีเหลืองติดที่ขอบแผ่นก้านเกสร เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อ รังไข่ได้วงกลีบ ยอดเกสรเป็นรูเปิด มีน้ำเหนียว พลาเซนตาติครอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง แดกกลางพู

ชื่อ มะละกอ  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Carica papaya L.*  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Caricaceae  
ชื่ออื่นๆ ก้วยลา, แดงต้น, มะก้วยเทศ, ลอกอ, หมักหุ้ง, มะเค๊ะ, สะกุกเส้, หมากซางพอ  
ชื่อภาษาอังกฤษ Papaya, Pawpaw, Tree melon

ไม้ล้มลุกต้น สูง 4-6 เมตร ลำต้นสีเทา มีรอยแผลเป็นที่เกิดจากการหลุดของใบ ลำต้นตรง มียางข้นขาวทุกส่วนของต้น แดงใบหนาแน่นที่ยอด ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบยอด ก้านใบสีเขียว กลวง ยาว 30-40 เซนติเมตร แผ่นใบรูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30-45 เซนติเมตร โคนรูปหัวใจ ปลายเรียวแหลม ขอบเว้าลึกเกือบถึงโคนใบเป็นหลายแฉก เนื้อใบค่อนข้างหนา ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม กว่าด้านท้องใบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน เส้นใบชัดเจน ดอกเดี่ยวหรือดอกช่อกระจะแยกแขนง ออกที่

ชอกก้านใบ สีขาวนวล มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศ ดอกเพศผู้มักแยกต้น ช่อดอกเพศผู้มีขนาดใหญ่ ก้านช่อดอกยาว ส่วนช่อดอกเพศเมียมีขนาดเล็ก ก้านช่อดอกสั้น ดอกย่อย เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียวหนา จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาวนวล จำนวน 5 กลีบ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 0.8-1 เซนติเมตร ยาว 3-4 เซนติเมตร ปลายแหลม มักจะมีวงบานออก ขอบเรียบ โคนตัดตรง เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ก้านสีขาว อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาว 3-4 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว แบ่งเป็น 5 แฉกเว้าลึกคล้ายนิ้วมือ มีขนสีขาวปกคลุมหนาแน่นและมีน้ำเหนียวๆ ห่อหุ้ม ยอดเกสรแหลมมีรูเปิด พลาเซนตาติดรอบผนัง ผลชนิดสด หลายเมล็ด

ชื่อ หนุ่ยป่ากึ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Murdannia loriformis* (Hassk.) Rolla Roa & Kammathy

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Commelinaceae

ชื่ออื่นๆ น้ำค้างกลางเที่ยง, หนุ่ยหงอนเหลือง, หนุ่ยเทวดา

ชื่อภาษาอังกฤษ

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ต้นสีเขียว อวบน้ำ แตกกอชูยอดตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มรอบข้อ แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบหนาอวบน้ำ มียางใส ด้านหลังและใบด้านท้องใบสีเขียวอมขาว ผิวเกลี้ยง ใบส่วนบนสั้นกว่าใบที่โคน ดอกช่อกระจุกสีม่วง ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาว 5-8 เซนติเมตร ช่อดอกห่อหุ้มด้วยใบประดับ 2 ใบ โคนซ้อนกัน ดอกย่อยสีม่วงอ่อนหรือสีฟ้าคราม เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยสั้นมาก กลีบดอก จำนวน 3 กลีบ รูปไข่กลีบ กว้างประมาณ 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร โคนสอบ ปลายมน ขอบเรียบ เนื้อบาง เกสรเพศผู้ จำนวน 6 อัน ก้านเกสรและอับเรณูสีม่วง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรสีม่วงพองออก พลาเซนตาติดรอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง แตกกลางพู

ชื่อ ว่านหอยแครง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tradescantia spathacea* Stearn

ชื่อพ้อง *Rhoeo discolor* (L'Herit.) Hance

ชื่อวงศ์ Commelinaceae

ชื่ออื่นๆ กาบหอยแครง

ชื่อภาษาอังกฤษ Oyster plant, White flowered tradescantia

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 0.5 เมตร แตกใบเป็นกระจุกตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ  
ซ้อนกันเป็นกระจุก ก้านใบไม่มี แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 25-35 เซนติเมตร  
โคนแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบหนา อวบน้ำ มียางใส ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม  
ด้านท้องใบสีม่วงหรือสีเขียว ผิวเรียบ ดอกช่อกระจุกสีขาว ออกที่ซอกใบ ห่อหุ้มด้วยใบประดับสี  
เขียวหรือม่วง 2 ใบ รูปฝ่ามือ กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ก้านช่อดอก  
ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร อวบน้ำ ดอกย่อยสีขาว เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5  
เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง จำนวน 3 กลีบสีขาว เนื้อบางใส รูป  
ไข่ กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบเรียบ กลีบดอก  
จำนวน 3 กลีบ สีขาว รูปไข่ กว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายแหลม  
ขอบเป็นคลื่น เนื้อบาง เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ จำนวน 6 อัน ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร  
ก้านเกสรสีขาว มีขนยาวรอบก้านเกสร อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อง รังไข่  
เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร รังไข่และก้านสีขาว ยอดเกสรสีเหลืองพองหนา พลาเซน  
ตาติดรอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง แตกกลางพู

ชื่อ กาบหอย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tradescantia virginiana* L.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์ Commelinaceae

ชื่ออื่นๆ หัวใจม่วง, ว่านหอย

ชื่อภาษาอังกฤษ Spiderwort

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 0.5 เมตร ต้นสีม่วงเข้ม อวบน้ำ ทอดนอนตามพื้นดินชูยอด  
ตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มรอบข้อ แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 3-3.5  
เซนติเมตร ยาว 10-13.5 เซนติเมตร โคนแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบหนาอว  
น้ำ มียางใส ด้านหลังใบและด้านท้องใบสีม่วงเข้ม ผิวเกลี้ยง ดอกช่อกระจุกสีม่วง ออกที่ปลายกิ่ง  
ก้านช่อดอกไม่มี ช่อดอกห่อหุ้มด้วยใบประดับ 2 ใบ ลักษณะเหมือนแผ่นใบแต่ขนาดเล็กกว่า โคน  
ซ้อนกัน ปลายกางออกตรงข้าม ดอกย่อยสีม่วงอ่อน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร  
ก้านดอกย่อยสั้นมาก มีริ้วประดับจำนวนมากติดที่โคนกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยง จำนวน 3 กลีบ สีขาว เนื้อ  
กลีบบางมีลายเส้นสีเขียว 1 เส้น รูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาว  
ประมาณ 0.6 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบเรียบ กลีบดอก จำนวน 3 กลีบ สีม่วงอ่อน รูปไข่กลับ  
กว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร โคนสอบ ปลายมน ขอบเป็นคลื่น เนื้อ

บาง เรียงซ้อนเหลื่อมกัน เกสรเพศผู้ จำนวน 6 อัน ยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร ก้านเกสรสีม่วง  
โคนปลายหยักและมีขนสีม่วงอ่อนยาวรอบก้าน อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3  
ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร รังไข่สีขาว ก้านเกสรสีม่วงอ่อน ยอดเกสรสี  
ขาวพองออก พลาเซนตาติครอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง แตกกกลางพู

ชื่อ ผักคราด

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Acmella oleracea* (L.) R.K.Jansen

ชื่อพ้อง *Spilanthes acmella* Murr.

ชื่อวงศ์ Compositae (Asteraceae)

ชื่ออื่นๆ ผักปราบ, ผักคุ่มหู, ผักเผ็ด, ผักคราดหัวแหวน, อั้งฮวยเถี้ย

ชื่อภาษาอังกฤษ Para cress

ไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียว ต้นสูงประมาณ 0.5 เมตร ลำต้นกลมเกลี้ยง ท่อนข้างอวบน้ำ แดกกิ่งใกล้  
โคนต้นเป็นพุ่มตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบยาว 1.5-2 เซนติเมตร มีขนสีขาว  
แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 2.5-3.5 เซนติเมตร ยาว 4.5-5 เซนติเมตร โคนรูปลิ้ม ปลายแหลม ขอบใบหยัก มี  
ขนเรียงเป็นพื่นเลื้อย เนื้อใบบาง ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีขนสีขาวที่เส้นกลางใบ  
ดอกช่อกระจุกแน่น สีเหลืองเข้ม ออกที่ซอกก้านใบใกล้ยอด ก้านช่อดอกยาวประมาณ 3 เซนติเมตร  
มีขนสีขาวปกคลุม รังประดับสีเขียว จำนวน 10 อัน เป็นเส้นเรียว ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร  
ปลายแหลม มีขนสีขาว เรียงเป็น 2 วง ดอกย่อยมีสองชนิด ดอกย่อยวงนอก เป็นดอกเพศเมีย กลีบ  
เลี้ยงไม่มี กลีบดอกสีเหลืองเข้ม เป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2-3 กลีบ มีขนสีขาวด้านนอกของหลอด  
เกสรเพศผู้ไม่มี เกสรเพศเมียประกอบด้วย 1 พู 1 ช่อง รังไข่ใต้วงกลีบ รังไข่สีดำ ยอดเกสรเป็น 2  
แฉก ดอกย่อยวงใน เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ใบประดับสีขาว เนื้อบางห่อหุ้มดอก ดอกยาวประมาณ 0.2  
เซนติเมตร กลีบดอกเป็นหลอด สีเขียว ปลายแยกเป็น 5 แฉก มีขนปกคลุม เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน  
แยกเป็นอิสระติดที่หลอดกลีบดอกใกล้โคน อับเรณูสีดำเชื่อมติดกันเป็นหลอด หุ้มก้านเกสรเพศเมีย  
เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 1 พู 1 ช่อง รังไข่ใต้วงกลีบ ยอดเกสรแยกเป็นสองแฉก ปลายมีวงลง  
พลาเซนตาติคที่ฐาน ผลชนิดแห้ง เมล็ดล่อน

ชื่อ ดาวกระจาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cosmos sulphureus* Cav.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Compositae (Asteraceae)

ชื่ออื่นๆ คำแหง, คำเมืองไหว, คำอังวะ

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียว ต้นสูง 0.5- 1 เมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยมสีเขียว มีขนกระจายห่างๆ แดกกิ่ง โกลีโคณต้นเป็นพุ่มตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบเป็นร่อง มีขนกระจายห่างๆ แผ่นใบรูปสามเหลี่ยม กว้าง 3.5-7 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร โคนเฉียง ปลายแหลม ขอบเป็นแฉก ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ผิวใบเกลี้ยง ดอกช่อกระจุกแน่น สีเหลืองหรือสีส้ม ออกที่ซอกก้านใบใกล้ยอด ก้านช่อดอกสีเขียวยาว 10-19 เซนติเมตร รังไข่ประดับสีเขียวลักษณะเป็นเส้น จำนวน 8 เส้น ติดที่ฐานรองดอกรูปจาน ดอกย่อยมีสองแบบ ดอกวงนอก เป็นดอกไม้สมบูรณ์ กลีบเลี้ยงไม่มี กลีบดอกจำนวน 1 กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ไม่มี เกสรเพศเมียไม่พัฒนา รังไข่ได้วงกลีบ ดอกวงใน เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงลักษณะเป็นเส้น สีเขียว จำนวน 2 เส้น ยาว 0.1-0.25 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลืองหรือสีส้ม เป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาวประมาณ 0.9 เซนติเมตร เมื่อกลิบบางเกลี้ยง เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเหลืองอ่อน มีขนรอบๆ แยกเป็นอิสระติดที่หลอดกลีบดอกใกล้โคน อับเรณูสีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด หุ้มก้านเกสรเพศเมีย เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 1 ช่อง รังไข่ได้วงกลีบ ยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร สีเขียว ก้านเกสรสีส้ม ยอดเกสรแยกเป็นสองแฉก ปลายม้วน พลาเซนตาติดที่ฐาน ผลชนิดแห้ง เมล็ดล่อน

ชื่อ	กะเม็ง
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.
ชื่อพ้อง	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk. ; <i>Verbesina prostata</i> L.; <i>Verbesina prostata</i> L.
ชื่อวงศ์	Compositae (Asteraceae)
ชื่ออื่นๆ	กะเม็งตัวเมีย, คัดเม็ง, หญ้าตับ, ย่อมเกี่ยว, บังกีเจ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ	False daisy, White head

ไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียว ต้นสูง 0.1- 0.6 เมตร ลำต้นมีขนกระจายห่างๆ แดกกิ่ง โกลีโคณต้นเป็นพุ่มตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปใบหอก กว้าง 0.6-2.5 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนติเมตร โคนรูปลิ้น ปลายแหลม ขอบจักห่างๆ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ผิวใบมีขน เนื้อใบสาก ดอกช่อกระจุกแน่น สีขาว ออกที่ยอด ก้านช่อดอกสีเขียวยาว 0.5-7 เซนติเมตร มีขนสั้น รังไข่ประดับสีเขียว จำนวน 5-6 ใบ ติดที่ฐานรองดอกรูปจาน รูปไข่ปลายแหลม ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ดอกย่อยมีสองชนิด ดอกย่อยวงนอก รูปลิ้น เป็นดอกเพศเมีย กลีบเลี้ยงไม่มี กลีบดอกสีขาว กว้างประมาณ 0.1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ดอกวงในกลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4 กลีบ สีขาว เป็นดอกสมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้ 4 อัน รังไข่ได้วงกลีบ พลาเซนตาติดที่ฐาน ผลชนิดแห้ง เมล็ดล่อน สีดำ

ชื่อ ว่านมหากาฬ  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gynura pseudochina* (L.) DC. var. *hispida* Thwaites  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Compositae (Asteraceae)  
 ชื่ออื่นๆ คาวเรือง  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียว ต้นสูง 0.5 เมตร ลำต้นอวบน้ำ โคนต้นทอคนอน แตกกิ่งชูช่อดอกตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบอวบน้ำ ยาว 1.5-2 เซนติเมตร แผ่นใบรูปใบหอก กว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 10-19 เซนติเมตร โคนเฉียง ปลายแหลม ขอบเป็นแฉก เนื้อใบหนาอวบน้ำ ด้านหลังใบสีเขียวขอบสีม่วง ด้านท้องใบสีอ่อนกว่า มีขนสีขาวยาวกระจายห่างๆ ดอกช่อกระจุกแน่น สีเหลืองเข้ม ออกที่ซอกก้านใบใกล้ยอด ก้านช่อดอกสีม่วงสลับเขียว เป็นร่อง ยาว 10-20 เซนติเมตร มีขนสีขาวยาวกระจายห่างๆ รั้วประดับลักษณะเป็นเส้น โคนสีเขียวปลายสีม่วง จำนวน 8 เส้น ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร ดิดที่ฐานรองดอก ดอกย่อยมีสองชนิด ใบประดับเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉกลึก ปลายเรียวแหลม จำนวน 13 เส้น ยาวประมาณ 1.4 เซนติเมตร โคนสีเขียว ปลายสีม่วง มีขนสีขาวยาว ดอกย่อยสีเหลืองเข้ม กลีบเลี้ยงเปลี่ยนรูปเป็นขนสีขาว จำนวนมาก ยาวประมาณ 0.9 เซนติเมตร กลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว แยกเป็นอิสระติดที่หลอดกลีบดอก อับเรณูสีเหลืองเข้ม เชื่อมติดกันเป็นหลอด ฝั่มส่วนปลายของก้านเกสรเพศเมีย เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 1 พู 1 ช่อง รังไข่ใต้วงกลีบ ยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรแยกเป็นสองแฉก ลักษณะเป็นพู่ ขนสีเหลืองเข้ม พลาเซนตาดิดที่ฐาน ผลชนิดแห้ง เมล็ดค่อนข้าง

ชื่อ กระจุกทองเหลือง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc.  
 ชื่อพ้อง *W. carnos* Pers. ; *Silphium trilobatum* L.  
 ชื่อวงศ์ Compositae (Asteraceae)  
 ชื่ออื่นๆ -

ชื่อภาษาอังกฤษ Climbing wedelia, Singapore dailys  
 ไม้ล้มลุกอายุหลายฤดู ลำต้นทอคนอนเลื้อยตามพื้นดิน แตกกิ่งเป็นพุ่มหนาชูยอดตั้งขึ้นสูงประมาณ 0.3 เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบไม่มี แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 3-3.5 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร โคนรูปลิ้ม ปลายแหลม ขอบจักเป็น 3 แฉก และจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบคายมือ หลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีหนามใสกระจายทั่วใบและพบมากที่เส้นใบ ดอกช่อกระจุกแน่น สีเหลืองเข้ม ออกที่ซอกก้านใบใกล้ยอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2

เซนติเมตร ก้านช่อดอกสีเขียวยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ใบประดับสีเขียว จำนวน 10 กลีบ รูปรี กว้าง 0.2-0.3 เซนติเมตร ยาว 0.5-0.7 เซนติเมตร มีขนสีขาว เรียงเป็นสองวง ดิดที่ฐานรองดอกรูป งาน ดอกย่อยมีสองชนิด ดอกย่อยวงนอก รูปรี เป็นดอกไม้สมบูรณ์ กลีบเลี้ยงสีเขียว เป็นหลอด ยาวประมาณ 0.1 เซนติเมตร มีขนใส กลีบดอก รูปรี ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร โคนเป็นหลอดสีเขียวใส ตอนปลายรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร ปลาย เข้าเป็น 3 หยัก เกสรเพศผู้ไม่มี เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 1 ช่อ รังไข่ได้วงกลีบ ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเหลืองขดเกสรแยกเป็น 2 แฉก พลาเซนตาติดที่ฐาน ดอกย่อยวงใน เป็น ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงเป็นหลอด ยาวประมาณ 0.1 เซนติเมตร ด้านนอกมีขนใส กลีบดอกสี เหลือง เป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาวประมาณ 0.85 เซนติเมตร เนื้อกลีบบางเกลี้ยง เกสรเพศ ผู้จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว แยกเป็นอิสระติดที่หลอดกลีบดอกใกล้ โคน อับเรณูสีน้ำตาลเชื่อมติดกันเป็นหลอด หุ้มก้านเกสรเพศเมีย เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 1 ช่อ รังไข่ได้วงกลีบ ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร รังไข่สีเขียว ก้านเกสรสีเหลือง ขดเกสรแยกเป็น สองแฉก ปลายมีวน พลาเซนตาติดที่ฐาน ผลชนิดแห้ง เมล็ดอ่อน

- ชื่อ กระจุมแสด
- ชื่อวิทยาศาสตร์ *Zinnia linearis* Benth.
- ชื่อพ้อง *Z. angustifolia* ...
- ชื่อวงศ์ Compositae (Asteraceae)
- ชื่ออื่นๆ กระจุมเงิน
- ชื่อภาษาอังกฤษ Little star

ไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียว ต้นสูงประมาณ 0.5 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ชูดอกตั้งขึ้น มีขนสีขาว ใบ เดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบไม่มี แผ่นใบรูปใบหอก กว้าง 0.3-1 เซนติเมตร ยาว 2.5-5.5 เซนติเมตร โคนรูปรี ปลายแหลม ขอบเรียบ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีขนสีขาวหนา แน่น เนื้อใบบาง ดอกช่อกระจุกแน่น สีขาวหรือสีเหลืองเข้ม ออกที่ปลายยอด ก้านช่อดอกยาว 3-5 เซนติเมตร มีขนสีขาวหนาแน่น ใบประดับสีเขียว จำนวน 3 ชั้น ดิดที่ฐานรองดอก ดอกย่อยมีสอง ชนิด ดอกย่อยวงนอก กลีบดอกจำนวน 1 กลีบ รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร ยาว ประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนสีขาว เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 1 พู 1 ช่อ รังไข่ได้วงกลีบ สีดำ มีขน สีขาว ดอกย่อยวงใน เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ใบประดับย่อย รูปรีกว้างประมาณ 0.15 เซนติเมตร ยาว ประมาณ 0.5 เซนติเมตร พบโค้งรูปท้องเรือ สีเหลือง เนื้อบางใส กลีบเลี้ยงลักษณะเป็นเส้น สีเขียว กลีบดอกสีเหลืองเข้ม เป็นหลอดรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร โคน ตอสีเขียว มีขนสีน้ำตาลหนาแน่นด้านนอก ด้านในมีขนสีเหลือง เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน รูปลูก ทราย อับเรณูสีเหลืองอ่อน ดิดที่หลอดกลีบดอก เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 1 พู 1 ช่อ รังไข่ได้วงกลีบ

มีขนสีขาว ก้านเกสรยาวถึงปากกรวย ยอดเกสรแยกเป็นสองแฉก ปลายมีวงลง พลาเซนตาติดที่ฐาน  
ผลชนิดแห้ง เมล็ดอ่อน

ชื่อ                    เอื้องหมาขาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Costus speciosus* (Koen.) Sm.

ชื่อพ้อง            -

ชื่อวงศ์            Costaceae

ชื่ออื่นๆ           เอื้องช้าง, เอื้องต้น, เอื้องเพ็ชร์, เอื้องใหญ่, ชูไลบ้อง, ชูเลโบ, บันไคสวรรค์

ชื่อภาษาอังกฤษ Crape ginger, Malay ginger, Spiral flag

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 1-1.5 เมตร ลำต้นใต้ดินชนิดเหง้า ลำต้นเหนือดินสีแดงโค้ง  
เวียนเป็นเกลียว ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบไม่มี แผ่นใบรูปหอกแกมรูปไข่กลับ กว้าง 4-7  
เซนติเมตร ยาว 12-18 เซนติเมตร โคนมน ปลายเรียวแหลม ขอบใบสีขาวมีขนเรียงเป็นฟันเลื่อย เนื้อ  
ใบหนานุ่ม ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม ด้านท้องใบมีขนสีเงินขาวยาวหนาแน่น ดอกช่อเชิงลด ออกที่  
ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกไม่มี ดอกย่อยเบียดชิดกันแน่นมาก ดอกย่อยทยอยออกทีละ 1-2 ดอกไป  
เรื่อยๆ มีใบประดับสีแดง จำนวน 2 ใบ เนื้อหนาแข็ง มีขนสีขาวหนาแน่นด้านนอก เมื่อบานเส้นผ่า  
ศูนย์กลางประมาณ 7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง รูปทรงกระบอก สีเขียว ปลายแยกเป็น 3 แฉก สีแดงมีขน  
สีขาวหนาแน่น ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอกสีขาวปนเหลือง จำนวน 5 กลีบ เรียงซ้อนเป็น 2 แถว รอบ  
นอกมีจำนวน 3 กลีบ สีขาวบางรูปรี กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร กลีบ  
ดอกชั้นในจำนวน 2 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกรูปปากเปิดขนาดใหญ่ ตรงกลางสีเหลืองเข้ม มี  
ขนสีเหลืองเข้ม และมีต่อมน้ำเหนียว เกสรเพศผู้ จำนวน 2 อัน ก้านเกสรและอับเรณูเชื่อมติดกับกลีบ  
ดอก เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อง รังไข่ได้วงกลีบ ยอดเกสรแผ่นบานช่วยเป็นริ้วขนาดใหญ่  
พลาเซนตาติดรอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง แฉกตามรอยตะเข็บ

ชื่อ                    ทองสามย่าน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Kalanchoe integra* (Medik.) Kuntze

ชื่อพ้อง            *K. laciniata* (L.) DC.; *K. spathulata* DC.

ชื่อวงศ์            Crassulaceae

ชื่ออื่นๆ           กะชีคู่ชะวะ, เถาไฟ, ฮอมแซม, ฝ้องสามย่าน

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 0.5 เมตร ต้นอวบน้ำ สีเขียวมีนวลสีขาวทั่วต้น ไม้แตกกิ่ง ใบ  
เดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ช่อดอกแน่นบริเวณ โคนต้นและจะยืดยาวขึ้นเมื่อมีการแทงช่อดอก  
ก้านใบยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 3-4.5 เซนติเมตร ยาว 5.5-9 เซนติเมตร โคน

คัด ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบหนาอวบน้ำ มียางขุ่น ด้านหลังใบและด้านท้องใบสีเขียวเข้ม มีนวลขาว ดอกช่อกระจุกช้อน สีเขียวปนแดง ออกที่ยอด ก้านช่อดอกยาว 7.5 เซนติเมตร ดอกย่อยสีเขียวปนแดงและจะแดงขึ้นเรื่อยๆ ดอกห้อยลง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียวแดง รูปโคมไฟ กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ปลายแหลมแยกเป็น 4 แฉก กลีบดอก จำนวน 4 กลีบ เชื่อมติดกัน รูปหลอด ปลายแหลมเป็นหาง เนื้อหนา เกสรเพศผู้ จำนวน 8 อัน ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเขียว อับเรณูสีแดงเข้ม เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 4 ช่อง รังไข่เหนียว กลีบ สีเขียวเป็นมัน ก้านเกสรยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร พลาเซนตาติดรอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง

ชื่อ                   ว่านงาช้าง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Sansevieria cylindrica* Bojer  
 ชื่อพ้อง             -  
 ชื่อวงศ์             Dracaenaceae  
 ชื่ออื่นๆ           ว่านงู, ว่านสาย, ว่านลิ้นเหี้ย, หางเสื่อ  
 ชื่อภาษาอังกฤษ

ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 1 เมตร ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยวกลม ยาวเรียว ปลายแหลม สีเขียวเข้มคล้ายวงช้าง แตกจากเหง้าใต้ดิน ชูตั้งขึ้น ยาว 45-60 เซนติเมตร ดอกช่อเชิงลด สีขาวอมเขียว ออกจากต้นใต้ดิน ชูช่อตั้งขึ้น ช่อดอกยาว 30-40 เซนติเมตร ดอกย่อย สีขาวนวล กลิ่นหอมอ่อนๆ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงไม่มี กลีบดอก รูปหลอด จำนวน 6 กลีบ ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร โคนเชื่อม เกสรเพศผู้ จำนวน 6 อัน ยาวประมาณ 1.4 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว ติดที่กลางกลีบดอกตรงรอยแยก อับเรณูสีเขียวอ่อน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 6 พู 3 ช่อง รังไข่เหนียว กลีบ สีเขียว ยาวประมาณ 2.3 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรสีเหลือง พลาเซนตาติดรอบแกนร่วม ผลชนิดสด

ชื่อ                   ลิ้นนาคราช  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Sansevieria trifasciata* Prain var. *trifasciata*  
 ชื่อพ้อง             -  
 ชื่อวงศ์             Dracaenaceae  
 ชื่ออื่นๆ           หอกพระอินทร์, ลิ้นมังกร, กะสีกือซอ, ป่องื่อซอ, ปอมือปลา, เป้าสะม่าเพล, ว่านหางเสื่อ, ว่านจะเข้, ว่านประหลาด  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Snake plant, Bowstring hemp

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 0.5-0.75 เมตร ลำต้นเป็นเหง้า แดงใบชูตั้งขึ้น มีขางไส ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบไม่มี แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 50-75 เซนติเมตร โคน แผ่นเป็นกาบ ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบหนาอวบ ผิวเกลี้ยง มีลายสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อนตาม ขวาง คอกข้อเชิงลด ออกจากเหง้าชูตั้งขึ้น ยาวประมาณ 55 เซนติเมตร ก้านช่อดอกกลมแข็ง ผิว เกลี้ยง สีเขียว คอกข้อ สีเขียวอ่อน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงไม่มี กลีบดอก รูปหลอด จำนวน 6 กลีบ ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร โคนเชื่อม เกสรเพศผู้ จำนวน 6 อัน ยาวประมาณ 1.4 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว ติดที่กลางกลีบดอกตรงรอยแยก อับเรณูสีเขียวอ่อน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 6 พู 3 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ สีเขียว ยาวประมาณ 2.3 เซนติเมตร ก้าน เกสรสีขาว ยอดเกสรสีเหลือง พลาเซนตาติดรอบแกนร่วม ผลชนิดสด

ชื่อ ไม้เหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Bambusa vulgaris* Schrad. ex H.Wendl. var. *vulgaris*

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Gramineae (Poaceae)

ชื่ออื่นๆ จันทน์, ไม้จีน, ไม้หลวง, ไร่ไซ, ไร่ใหญ่

ชื่อภาษาอังกฤษ Feathery bamboo, Golden bamboo

ไม้ล้มลุกอายุหลายฤดู แดงหน่อเป็นกอ ลำต้นสูง 5-10 เมตร ปลายลำโค้งลง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 เซนติเมตร ข้อโปนเล็กน้อย กาบหุ้มมีขนยาวสีน้ำตาลแก่หรือสีดำ ปล้องยาว 20-30 เซนติเมตร ใ้สีคลวง แดงแขนงมากตอนครึ่งบนของลำ ผิวเกลี้ยงสีเขียวเหลือง มีแถบเส้นสีเขียวแก่ ใบเดี่ยว แผ่นใบรูปรีขอบขนาน กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ด้านหลังใบและด้าน ท้องใบสีเขียวแก่ ท้องใบมีขนละเอียด

ชื่อ ตะไคร้

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cymbopogon citratus* Stapf

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Gramineae (Poaceae)

ชื่ออื่นๆ คาหอม, ไคร, จะไคร, เจ็ดเกรย, ห่อวอตะโป้, หัวสิงโต, เหลอะเกรย

ชื่อภาษาอังกฤษ Lemon grass, Lapine

ไม้ล้มลุกอายุหลายฤดู สูง 0.75-1.2 เมตร ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า แดงใบแน่นเป็นกอหุ้มกลม เหง้าใต้ดินมีกลิ่นเฉพาะ ข้อและปล้องสั้นมาก ใบเดี่ยวสีเขียว ออกเวียนสลับรอบข้อ แผ่นใบรูปขอบ ขนานแคบยาว กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 70-100 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนแผ่นเป็นกาบหุ้ม ช้อนกันแน่น สีขาว ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยเล็กๆ กมและสาก ออกดอกยาก

ชื่อ ตะไคร้หอม  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cymbopogon winterianus* Jowitt.  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Gramineae (Poaceae)  
ชื่ออื่นๆ จะ โคมะขูด, ตะไคร้มะขูด, ตะไคร้แดง  
ชื่อภาษาอังกฤษ Citronella grass

ไม้ล้มลุกอายุหลายฤดู สูง 1-1.5 เมตร ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า แดกใบแน่นเป็นกอพุ่มกลมเหง้าใต้ดินมีกลิ่นเฉพาะ ช่อและปล้องสั้นมาก ใบเดี่ยวสีเขียวปนสีม่วงแดง ออกเวียนสลับรอบช่อ แผ่นใบรูปขอบขนานแคบยาว กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 100-150 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนแผ่เป็นกาบหุ้มซ้อนกันแน่น สีขาว ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยเล็กๆ กมและสาก เมื่อใบค่อนข้างบาง ทำให้ปลายใบห้อยลงปรกดิน ดอกช่อสีน้ำตาลปนเขียว แทงออกจากกลางต้น ช่อดอกยาว 1.5-2 เมตร ก้านช่อดอกกลม แข็งและเกลี้ยงเป็นมัน ดอกย่อยสีเขียวปนน้ำตาลห่อหุ้มด้วยใบประดับ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกไม่มี ผลชนิดแห้ง ไม่แตก

ชื่อ อ้อยแดง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Saccharum officinarum* L.  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Gramineae (Poaceae)  
ชื่ออื่นๆ อ้อย, อ้อยขม, อ้อยดำ  
ชื่อภาษาอังกฤษ Red sugar-cane

ไม้ล้มลุกอายุหลายฤดู สูง 2-5 เมตร ลำต้นสีม่วงแดงถึงดำ มีนวลสีขาวปกคลุม เห็นข้อปล้องชัดเจน เนื้อต้นฉ่ำน้ำ มีรสหวาน แดกกอที่โคนต้น ใบเดี่ยวสีเขียวปนสีม่วงแดง ออกเวียนสลับรอบช่อตอนบนๆ แผ่นใบรูปขอบขนานยาว กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 75-120 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยเล็กๆ กมและสาก เมื่อใบสาก มีขนทั้งสองด้าน ดอกช่อกระจะแยกแขนงขนาดใหญ่ สีเทาเงิน แทงออกจากกลางต้น ช่อดอกยาว 2-3 เมตร ก้านช่อดอกกลม แข็งและเกลี้ยงเป็นมัน ดอกย่อยสีเงิน มีขนสีขาวยาว ห่อหุ้มด้วยใบประดับ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกไม่มี ผลชนิดแห้ง ไม่แตก

ชื่อ ไร่รวก  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Thyrsostachys siamensis* Gamble  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Gramineae (Poaceae)

ชื่ออื่นๆ ตีโย, รวก, ฮวก, แวปิ้ง, แวบ้าง, สะลอม

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกอายุหลายฤดู แดกหน่อเป็นกอ ลำต้นสูง 5-8 เมตร ปลายลำโค้งลง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร ข้อโปนเล็กน้อย กาบหุ้มมีขนขาวสีน้ำตาลแก่หรือสีดำ ปล้องยาว 25-30 เซนติเมตร ใ้กลาง แดกแขนงมากตอนครึ่งบนของลำ ผิวเกลี้ยงสีเขียว ใบเดี่ยว แผ่นใบรูปรีขอบขนาน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร ด้านหลังใบและด้านท้องใบสีเขียวอ่อน ท้องใบมีขนละเอียด

ชื่อ พุทธรักษาญี่ปุ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Heliconia psittacorum* L.f.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Heliconiaceae

ชื่ออื่นๆ ธรรมรักษา, เขอร์มัน

ชื่อภาษาอังกฤษ Parrot's flower

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 2 เมตร ลำต้นได้คินเป็นเหง้า แดกใบชูตั้งขึ้นเป็นพุ่ม ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบเป็นกาบ อวบน้ำ ม้วนซ้อนกันแน่นคล้ายคัน แผ่นใบรูปหอก กว้าง 11-15 เซนติเมตร ยาว 24-45 เซนติเมตร โคนเฉียง ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนาและเหนียว ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ เส้นกลางใบอวบน้ำ ดอกช่อวงแหวนและออกที่ซอกใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1 เมตร ช่อดอกย่อยห่อหุ้มด้วยใบประดับ เนื้อแข็งและเหนียว สีเหลืองเข้ม ดอกย่อย สีเหลืองเข้ม ห่อหุ้มด้วยใบประดับ เนื้อบางใสคล้ายกระดาษ วงกลีบรวม จำนวน 3 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน กว้าง 0.2-1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.8 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมรูปไข่กว้าง เนื้อเหนียวคล้ายกระดาษ ปลายเรียวแหลมหรือเว้า เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว โคนเชื่อมติดกัน มีปลอกหุ้มโคนก้านเกสร อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อ รังไข่ได้วงกลีบ ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเหลือง ยอดเกสรสีขาว ปลายเรียวเป็นรูเปิด พลาเซนตาติดที่ฐาน รังไข่ไม่พัฒนาเป็นผล

ชื่อ สร้อยกัทลี

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Heliconia rostrata* Ruiz & Pavon

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Heliconiaceae

ชื่ออื่นๆ -

ชื่อภาษาอังกฤษ Hanging lobster-claws

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 2 เมตร ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า แดงใบชูตั้งขึ้นเป็นพุ่มโปร่ง ใบเดี่ยว ออกสลับ ก้านใบ ขาวประมาณ 50 เซนติเมตร โคนแผ่เป็นกาบ อวบน้ำ แผ่นใบรูปหอก กว้าง 10-11 เซนติเมตร ยาว 40-45 เซนติเมตร โคนเฉียง ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา และเหนียว ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ เส้นกลางใบอวบน้ำ ดอกช่อวงแหวนคู่ สีแดงเข้ม เข้มสีเหลืองและสีเขียว ออกที่ซอกใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 70 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยห่อหุ้ม ด้วยใบประดับ เนื้อแข็งและเหนียว โคนสีแดงเข้ม ปลายสีเหลืองขอบสีเขียว ปลายแหลม ดอกย่อยสี เหลืองอ่อนอมขาว ห่อหุ้มด้วยใบประดับ เนื้อบางใสคล้ายกระดาษ วงกลีบรวม จำนวน 2 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน กว้าง 0.6-1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.7 เซนติเมตร รูปไข่ เนื้อเหนียวคล้ายกระดาษ ปลายเรียวแหลม เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 3.7 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว อันเรณูสี เหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อ รังไข่ได้วงกลีบ ยาวประมาณ 4.3 เซนติเมตร รัง ไข่สีขาวยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรสีขาว ปลายแผ่บานเล็กน้อย พลาเซน ทาคิดที่ฐาน รังไข่ไม่พัฒนาเป็นผล

- ชื่อ สระระแหง
- ชื่อวิทยาศาสตร์ *Mentha cordifolia* Opiz ex Fresen
- ชื่อห้อง
- ชื่อวงศ์ Labiatae (Lamiaceae)
- ชื่ออื่นๆ มังกะเจ, สะเน่, สระระแหงสวน, หอมคว้น, สระระแหง
- ชื่อภาษาอังกฤษ Kitchen mint

ไม้ล้มลุก เลื้อยแผ่ไปตามดิน ลำต้นเป็นเหลี่ยม สีเขียวแกมม่วงน้ำตาล แดกกิ่งชูตั้งขึ้นเป็นพุ่ม แน่น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบสั้นมาก แผ่นใบรูปรีค่อนข้างกว้าง กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย ผิวใบขน เนื้อใบค่อนข้างบาง ด้าน หลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีกลิ่นหอมเฉพาะ ดอกช่อกระจุก ออกที่ซอกก้านใบ ผลชนิดแห้ง ไม้แตก

- ชื่อ แมงลัก
- ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ocimum americanum* L.
- ชื่อห้อง *O. canum* Sims
- ชื่อวงศ์ Labiatae (Lamiaceae)
- ชื่ออื่นๆ ก้อมก้อขาว, มังลัก, ผักอีตุ๋
- ชื่อภาษาอังกฤษ Hoary basil

ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 0.5 เมตร ต้นสีเทา มีรอยแตก แฉกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มตั้งขึ้น มีขนสั้น สีขาว ใบเดี่ยวสีเขียวอ่อน ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปรี กว้าง 1.7-2.5 เซนติเมตร ยาว 4.3-5.5 เซนติเมตร โคนรูปเหลี่ยม ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบบาง มีกลิ่นเฉพาะหอมแรง ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีต่อมน้ำมันหอมระเหย ดอกช่อฉัตร สีขาวปนเขียว ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกไม่มี ดอกย่อย สีขาว เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียว จำนวน 5 กลีบ รูปปากเปิด กว้างประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ด้านนอกมีขนสีขาวหนาแน่น ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอก รูปปากเปิด จำนวน 5 กลีบ แบ่งเป็น 4 กีบ 1 ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร โคนเชื่อม เนื้อกลีบบาง ด้านในเกลี้ยง ด้านนอกสีขาวยาว เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ขนาดสั้น 1 คู่ ยาว 1 คู่ ยาว 0.6-0.8 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว มีขนยาวที่โคน อับเรณูสีขาว เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 4 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร รังไข่สีเขียว แต่ละพูแยกเป็นอิสระ ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรสีขาวแยกเป็น 2 แฉก พลาเซนตาติดที่ฐาน ผลชนิดแห้ง แตกแบบเปิดฝา

ชื่อ	โหระพา
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Ocimum basilicum</i> L.
ชื่อห้อง	
ชื่อวงศ์	Labiatae (Lamiaceae)
ชื่ออื่นๆ	ห่อถั่วชวย, ห่อวอซู, อิมกิมขาว
ชื่อภาษาอังกฤษ	Sweet basil, Common basil

ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 0.5 เมตร ต้นสีเทา มีรอยแตก แฉกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มตั้งขึ้น มีขนสั้นสีขาว ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปรี กว้าง 1.7-2.5 เซนติเมตร ยาว 4.3-5.5 เซนติเมตร โคนรูปเหลี่ยม ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบบาง มีกลิ่นหอม ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีขนสีขาว มีต่อมน้ำมันหอมระเหย ดอกช่อฉัตร สีม่วงปนเขียว ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกไม่มี ดอกย่อย สีขาวอมม่วง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียวปนม่วง จำนวน 5 กลีบ รูปปากเปิด กว้างประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ด้านนอกมีขนสีขาวหนาแน่น ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอก รูปปากเปิด จำนวน 5 กลีบ แบ่งเป็น 4 กีบ 1 ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร โคนเชื่อม เนื้อกลีบบาง ด้านในเกลี้ยง ด้านนอกสีขาวยาว เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ขนาดสั้น 1 คู่ ยาว 1 คู่ ยาว 0.6-0.8 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว มีขนยาวที่โคน อับเรณูสีขาว เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 4 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร รังไข่สีเขียว แต่ละพูแยกเป็นอิสระ ก้านเกสรสีม่วง ยอดเกสรสีขาวแยกเป็น 2 แฉก พลาเซนตาติดที่ฐาน ผลชนิดแห้ง แตกแบบเปิดฝา

ชื่อ	กะเพรา
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.
ชื่อพ้อง	<i>O. sanctum</i> L.
ชื่อวงศ์	Labiatae (Lamiaceae)
ชื่ออื่นๆ	กอมก้อ, กอมก้อคง, กะเพราขาว, กะเพราแดง, กะเพราขน, ห่อถั่วอู, ห่อตุปูลู, อิมกิมหล้า, อีตูไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ	Holy basil, Thai basil

ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 0.5 เมตร ต้นสีเทา แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มตั้งขึ้น มีขนหนาแน่น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนสีขาวหนาแน่น แผ่นใบรูปรีกว้าง 1.2-1.6 เซนติเมตร ยาว 3.2-4 เซนติเมตร โคนรูปกลม ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย มีขนใสเรียงรอบขอบใบ เนื้อใบบาง มีกลิ่นหอม ด้านหลังใบและด้านท้องใบสีเขียวอ่อน มีขนยาวที่เส้นใบ มีต่อมน้ำมันหอมระเหย ดอกช่อฉัตร สีเขียว ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกไม่มี ดอกย่อย สีขาว เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียวอ่อน จำนวน 5 กลีบ รูปปากเปิดกว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ด้านนอกมีขน ด้านในเกลี้ยง ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอก สีขาว รูปปากเปิด จำนวน 5 กลีบ แบ่งเป็น 4 กีบ 1 ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร โคนเชื่อม เนื้อกลีบบาง ด้านในเกลี้ยง ด้านนอกมีขน เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 4 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร รังไข่สีเขียว แต่ละพูแยกเป็นอิสระ ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรสีเหลืองแยกเป็น 2 แฉก พลาเซนตาติดที่ฐาน ผลชนิดแห้ง แตกแบบเปิดฝา

ชื่อ	หญ้าหนวดแมว
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.
ชื่อพ้อง	<i>O. grandiflorus</i> Bold.
ชื่อวงศ์	Labiatae (Lamiaceae)
ชื่ออื่นๆ	พยับแมว, บางรักป่า, อีตุ้ง
ชื่อภาษาอังกฤษ	Cat's whisker

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 1 เมตร ต้นสีเหลือง สีเขียว แตกกิ่งใกล้โคนต้นเป็นพุ่ม ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบยาว 0.8-1.1 เซนติเมตร แผ่นใบรูปรี กว้าง 1.7-2.2 เซนติเมตร ยาว 4.5-5 เซนติเมตร โคนรูปกลม ปลายเรียวแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบบาง ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีขนที่เส้นใบ ดอกช่อฉัตร สีขาว ออกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 13-16 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 1.5-4 เซนติเมตร ดอกย่อย สีขาว เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียว จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยก ยาวประมาณ 0.5

เซนติเมตร ด้านนอกสีเขียว มีขนสีม่วงหนาแน่น ด้านในเกลี้ยง กลีบดอก สีขาวอมม่วง รูปปากเปิด  
จำนวน 5 กลีบ แบ่งเป็น 4 กับ 1 ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร โคนเชื่อมเป็นหลอด เนื้อกลีบบาง ด้าน  
ในเกลี้ยง ด้านนอกมีขนสีม่วง เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว  
อับเรณูสีม่วงเข้ม เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 4 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 4.5  
เซนติเมตร รังไข่สีเขียว แต่ละพูแยกเป็นอิสระ ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรสีม่วงเข้ม พลาเซนตาติดที่  
ฐาน ผลชนิดแห้ง เมล็ดล่อน

ชื่อ ฤาษีผสมแล้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Plectranthus scutellarioides* (L.) R.Br.

ชื่อพ้อง *Coleus scutellarioides* (L.) Benth. ; *C. atropurpureus* Benth.

ชื่อวงศ์ Labiatae (Lamiaceae)

ชื่ออื่นๆ ว่านเลือดแห้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 1 เมตร ลำต้นเหลี่ยมค่อนข้างอวบน้ำ สีเขียวหรือสีน้ำตาล  
แดง มีขนสีน้ำตาลแดง แตกกิ่งใกล้โคนต้น เป็นพุ่มคั่งขึ้น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบ  
ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลแดงหรือสีขาว หูใบเป็นขนสีขาวยาวอยู่ระหว่างก้านใบ แผ่น  
ใบรูปสามเหลี่ยม กว้าง 5-6 เซนติเมตร ยาว 6-8 เซนติเมตร โคนตัดตรง ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟัน  
เลื่อย เนื้อใบหนา ด้านหลังใบและด้านท้องใบมีหลายสี มีขนสั้นสีขาว ดอกช่อฉัตรแยกแขนง สีขาว  
หรือสีขาวอมม่วงอ่อนๆ ออกที่ยอด ดอกย่อย สีขาวอมม่วง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.6  
เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียวปนม่วง จำนวน 2 กลีบ รูปปากเปิด กว้างประมาณ 0.15 เซนติเมตร ยาว  
ประมาณ 0.3 เซนติเมตร ด้านนอกมีขนสีขาวหนาแน่น ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอก รูปปากเปิด  
จำนวน 5 กลีบ แบ่งเป็น 4 กับ 1 ยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร โคนเชื่อม เนื้อกลีบบาง ด้านในเกลี้ยง  
ด้านนอกสีม่วงอ่อน เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ขนาดสั้น 1 คู่ ยาว 1 คู่ ยาว 0.5-0.6 เซนติเมตร ก้าน  
เกสรสีขาว โคนเชื่อมติดกันเล็กน้อย อับเรณูสีม่วง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 4 ช่อง รังไข่เหนือ  
วงกลีบ ยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร รังไข่สีเขียว แต่ละพูแยกเป็นอิสระ ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรสี  
ม่วงแยกเป็น 2 แฉก พลาเซนตาติดที่ฐาน ผลชนิดแห้ง

ชื่อ พระจันทร์ครึ่งซีก

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lobelia chinensis* Lour.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Lobeliaceae

ชื่ออื่นๆ บัวครึ่งซีก, บัวใบไม้

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกฤดูเดียว สูงประมาณ 12 เซนติเมตร ลำต้นทอคนอนติดดิน แดกกิ่งชูช่อคอกตั้งขึ้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ก้านใบไม่มี แผ่นใบรูปใบหอก กว้าง 0.25-0.5 เซนติเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร โคนมน ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบบาง ด้านหลังใบและด้านท้องใบสีใกล้เคียงกัน ดอกเดี่ยว สีชมพูอ่อน ออกที่ซอกก้านใบใกล้ๆ ยอด ก้านดอกยาว 1-3 เซนติเมตร เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียว จำนวน 5 กลีบ เป็นเส้นสีเขียวเรียวแหลม ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ติดทนถึงผลแก่ กลีบดอก สีชมพู จำนวน 5 กลีบ รูปรี กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร โคนเชื่อมติดกันเป็นแผ่น เนื้อกลีบบาง มีขนสีขาวทั้งด้านนอกและด้านใน เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเขียว มีขนสีขาว อับเรณูสีม่วงเข้ม เชื่อมติดกันห่อหุ้มเกสรเพศเมียไว้ภายใน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 2 ช่อง รังไข่ได้วงกลีบ ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ก้านเกสรสีม่วง ยอดเกสรแผ่บานออกเป็นขน พลาเซนตาติครอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง เป็นฝักกลมรี ยาว 2-3 เซนติเมตร แดกเมื่อแก่

- ชื่อ                     กล้วยน้ำว้า
- ชื่อวิทยาศาสตร์    *Musa sapientum* L.
- ชื่อพ้อง
- ชื่อวงศ์              Musaceae
- ชื่ออื่นๆ            กล้วยเถื่อน, กล้วยเถื่อนน้ำมัน, กล้วยป่า, กล้วยลิง, กล้วยหม่น, กล้วยไข่, กล้วยใต้, กล้วยส้ม, กล้วยหอม, กล้วยนาถ, กล้วยเล็บมือ, กล้วยหอมจันทร์, กล้วยหักมุก, กล้วยกะลืออ่อง, กล้วยมะนิอ่อง, มะลืออ่อง, เจก, ยาไข่, สะกุก

ชื่อภาษาอังกฤษ Cultivated banana, Banana

ไม้ล้มลุกฤดูเดียว สูงประมาณ 4 เมตร ลำต้นได้ดินเป็นเหง้า ลำต้นเหนือดินเกิดจากกาบใบหุ้มซ้อนกันตั้งขึ้น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบเป็นกาบ อวบน้ำ มีวนซ้อนกันแน่นคล้ายคัน ยาวประมาณ 2.5 เมตร แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 40-60 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร โคนตัด ปลายตัด ขอบเรียบ เนื้อใบหนาและเหนียว ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ เส้นกลางใบอวบน้ำ มีนวลขาว ดอกช่อเชิงลด ออกที่ปลายยอด ก้านช่อคอกยาวประมาณ 1 เมตร ช่อคอกย่อยห่อหุ้มด้วยใบประดับ เนื้อแข็งและเหนียว สีแดง รูปท้องเรือ กว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร เนื้อหนาและเหนียว มีนวลขาว ดอกย่อย สีขาวอมชมพู เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง จำนวน 5 กลีบ เชื่อมติดเป็นแผ่น ปลายแยกเป็นเส้นสีน้ำตาล ขอบหยัก กลีบดอก สีเหลืองนวล รูปท้องเรือ กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาวแบน อับเรณูสีน้ำตาล เกสรเพศ

เม็ช ประกอบด้วย 3 พู 1 ช่อ รังไข่โค้งกลีบ ยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสร  
ทองออกสีน้ำตาล พลาเซนตาติดที่ผนัง ผลชนิดสด มีเนื้อหลายเมล็ด

ชื่อ บัวหลวง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Nelumbo nucifera* Gaertn.  
ชื่อพ้อง *N. speciosum* Willd.  
ชื่อวงศ์ Nelumbonaceae  
ชื่ออื่นๆ บัว, สัตตบงกช, สัตตบุษย์, อุบล, โฉก  
ชื่อภาษาอังกฤษ Egyptian bean, Sacred lotus

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าและเป็นไหลเหนือดินใต้น้ำ แดกก้านใบจากข้อของ  
ลำต้นชูแผ่นใบเหนือผิวน้ำ ใบเดี่ยว ก้านใบกลมเรียวแข็งชูแผ่นใบเหนือผิวน้ำ ติดกลางหลังใบ มี  
หนามเป็นตุ่มเล็กๆ มียางใสเมื่อถูกอากาศเป็นสีคล้ำ แผ่นใบ รูปร่างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  
30 เซนติเมตร ขอบเรียบเป็นคลื่น ด้านหลังใบและด้านท้องใบเรียบเป็นมัน ดอกเดี่ยวอยู่เหนือน้ำ  
เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 15-25 เซนติเมตร ก้านดอกมีลักษณะเหมือนก้านใบ กลีบเลี้ยง จำนวน 4-5  
กลีบ ขนาดเล็ก สีเขียว กลีบดอกจำนวนมากเรียงซ้อนกันหลายชั้น สีชมพู สีขาว เกสรเพศผู้ จำนวน  
มาก ติดอยู่รอบฐานรองดอกที่บวมขยายใหญ่หุ้มรังไข่ไว้ภายใน เรียกฝักบัว อับเรณู สีเหลือง เกสร  
เพศเมีย ประกอบด้วย 1 พู 1 ช่อ รังไข่ขนาดใหญ่ฝังอยู่ในฐานรองดอก ยอดเกสรติดกับรังไข่ด้าน  
บน พลาเซนตาที่ยอด ผลกลุ่ม มีเมล็ดขนาดใหญ่ ใบเลี้ยงหารับประทานได้

ชื่อ บัวสุราสีโนบล  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Nymphaea capensis* Thunb. var. *zanzibariensis* Casp.  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae  
ชื่ออื่นๆ บัวผันฝรั่ง, ม่วงกษัตริย์  
ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกหลายปี ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า แดกก้านใบชูแผ่นใบที่ผิวน้ำ ใบเดี่ยว ก้านใบยาวตาม  
ระดับน้ำ แผ่นใบกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 18-30 เซนติเมตร ปลายมน โคนใบหยักลึก ขอบจักไม่เป็น  
ระเบียบ ด้านหลังใบเขียวเป็นมัน ด้านท้องใบสีเขียวเหลืองน้ำตาล เส้นใบชัดเจน ดอกเดี่ยวอยู่เหนือ  
น้ำ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 15-18 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง จำนวน 4 กลีบ กลีบดอกจำนวนมาก สีม่วง  
อมชมพูหรือสีม่วงอมน้ำเงิน เกสรเพศผู้ จำนวนมาก สีเหลือง ตอนปลายสีเดียวกับกลีบดอก เกสร  
เพศเมีย ประกอบด้วยหลายพู หลายช่อ พลาเซนตาติดที่ผนัง ผลเดี่ยวชนิดสด

ชื่อ บัวสาย  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Nymphaea pubescens* Willd.  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae  
ชื่ออื่นๆ บัวสายแดง, บัวสายสีชมพู, รัตอุบล, เสวตุบล, สัตตบรรณ  
ชื่อภาษาอังกฤษ Water lily

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าสั้นๆ แดกก้านใบชูแผ่นใบที่ผิวน้ำ ใบเดี่ยว ก้านใบยาวตามระดับน้ำ แผ่นใบลอยเรียงเป็นวงที่ผิวน้ำ รูปร่างค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร ปลายมน โคนใบเว้าหักลึก ขอบจักเป็นฟันเลื่อยใหญ่ ด้านหลังใบเรียบเป็นมัน ด้านท้องใบสีเขียวอมม่วงมีขนนุ่มๆ เส้นใบใหญ่หนา ดอกเดี่ยวอยู่เหนือน้ำ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร ก้านดอกมีลักษณะเหมือนก้านใบ มียางใสและมีท่ออากาศมาก กลีบเลี้ยงจำนวน 4 กลีบ สีเขียวคล้ำ กลีบดอกจำนวนมากเรียงซ้อนกันหลายชั้น สีม่วงแดง สีชมพู สีขาว เกสรเพศผู้ จำนวนมาก ลักษณะเป็นแผ่นแบนมีอับเรณูเป็นร่องขนานกันตามความยาวสีเหลืองหรือสีตามกลีบดอก เกสรเพศเมีย ประกอบด้วยหลายพู หลายช่อง รังไข่ขนาดใหญ่ติดกับชั้นกลีบดอก ยอดเกสรติดกับรังไข่ด้านบนตามแนวรัศมี พลาเซนตาติดที่ผนัง ผลเดี่ยวชนิดสด มีเมล็ดมาก

ชื่อ เตยหอม  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pandanus amaryllifolius* Roxb.  
ชื่อพ้อง *P. odoratus* Ridl.  
ชื่อวงศ์ Pandanaceae  
ชื่ออื่นๆ ปาแนะวอจิง, เตยน้อย, เตยน้ำ, เตยแก้ว, เตย, เตยหิน  
ชื่อภาษาอังกฤษ Pandanus wangi

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 0.5 เมตร ลำต้นตั้งตรงหรือเลื้อยทอดนอนเล็กน้อยชูปลายยอดตั้งขึ้น โคนต้นมีรากคล้ำจุนและรากอากาศแตกจากข้อ ไม้แตกกิ่ง ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบไม่มี แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาว 20-50 เซนติเมตร โคนตัด ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบหนาและเหนียว กลางใบเป็นร่องยาวตลอดแผ่นใบ ด้านหลังใบและด้านท้องใบสีเขียวอ่อน ใบมีกลิ่นหอม ดอกช่อขนาดเล็ก มีใบประดับรองรับช่อดอก ดอกย่อยขนาดเล็กแยกเพศสีขาว ไม่มีกลีบดอก มักไม่ค่อยพบดอก

ชื่อ หญ้าหนูต้น  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dianella ensifolia* (L.) DC.  
ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Phormiaceae  
 ชื่ออื่นๆ โก่อ้าแต่น, มะพร้าวป่า, ศรีคัน ไชย, ลำพัน, หญ้าหนู, หอมแดง, ชียะ, เชียฮ๊ะ, ว่าน  
 มีคัยบ

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกหลายฤดู สูงประมาณ 0.5 เมตร ลำต้นได้ดินชนิดเหง้า ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ก้านใบ  
 แผ่นเป็นกาบซ้อนกัน แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร  
 โคนรูปกลม ปลายแหลม ขอบเป็นหนามจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบหนาและเหนียว ด้านหลังใบสีเขียว  
 เข้มขอบในขาว ด้านท้องใบสีอ่อนกว่า ดอกช่อแยกแขนง สีม่วงอมฟ้าอ่อน ออกที่ยอด ก้านช่อดอก  
 กลม ยาวประมาณ 23 เซนติเมตร ดอกย่อย สีม่วงอมฟ้าอ่อน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1  
 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง จำนวน 3 กลีบ รูปรี กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร  
 ปลายมน เนื้อหนา ด้านบนสีม่วงอมฟ้าเข้ม มีลายเส้นขนานจาก โคนถึงปลาย ด้านล่างสีเข้มกว่า กลีบ  
 ดอก จำนวน 3 กลีบ รูปรี กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร สีฟ้าอ่อน มี  
 เส้นสีเหลืองตรงกลาง ปลายเว้า ขอบเป็นคลื่น เกสรเพศผู้ จำนวน 6 อัน ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร  
 ก้านเกสรสีขาว อับเรณูสีน้ำตาล โคนสีเหลืองเข้ม เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 6 พู 3 ช่อง รังไข่เหนือ  
 วงกลีบ ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร สีเหลือง ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรแหลมเป็นรูปเปิด พลาเซนตา  
 ตีกรอบแกนร่วม

ชื่อ ฟ้าปูลู

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Piper sarmentosum* Roxb.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Piperaceae

ชื่ออื่นๆ นมวา, ผักปุนา, ผักพลุนก, พูลูลิง, เย่เที้ย

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุก ลำต้นสีเขียว สูง 30-80 เซนติเมตร มีไหลงอกเป็นต้นใหม่ ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ  
 ก้านใบยาวประมาณ 2 เซนติเมตร แผ่นใบรูปหัวใจ กว้าง 5-10 เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร โคน  
 เว้า ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่น ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ผิวกลี้ยงเป็นมัน ใบ  
 มีกลิ่นหอม ดอกช่อเชิงลด รูปทรงกระบอก สีขาวแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำ ยาว 3-4 เซนติเมตร ออกที่  
 ชอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ดอกแยกเพศอยู่บนช่อดอกเดียวกัน รังไข่เหนือ  
 วงกลีบ ผลชนิดสด

ชื่อ ตะขาบบิน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Muehlenbeckia platyclada* (F.Muell.) Meisn.

ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Polygonaceae  
 ชื่ออื่นๆ ตะขบปิ่นกล้วย, เพว, เฟอ, ว่านตะขบ, ว่านตะเข็บ, ตะขบหิน  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 0.5-1 เมตร ลำต้นสีเขียว ลักษณะแบนคล้ายใบทำหน้าที่แทนใบ แตกกิ่งมาก ใบเดี่ยวลักษณะเป็นเกี๋ยงเล็ก ๆ ร่องรับช่อดอก ออกสลับ ดอกช่อซี่ร่ม ออกที่ซอก ก้านช่อดอกไม่มี ดอกย่อย มีสองแบบ ดอกย่อยสีเขียวขาวกับดอกย่อยสีแดงเข้ม เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียวและสีแดงเข้ม จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกแหลม อวบน้ำ ยาว 0.2-0.3 เซนติเมตร กลีบดอกไม่มี เกสรเพศผู้ จำนวน 8 อัน ก้านเกสรเชื่อมติดที่โคนกลีบเลี้ยง อับเรณูสี่เหลี่ยมและสีขาว เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาว 0.1-0.25 เซนติเมตร รังไข่เป็นสันปีกยื่นขึ้นมา ยอดเกสรสีขาวและสีเหลือง แยกเป็น 3 แฉก ผลาเซนตาดิดที่ฐาน ผลไม่พัฒนา

ชื่อ ผักคบขาว  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Eichhornia crassipes* (C.Mart.) Solms  
 ชื่อพ้อง *E. speciosa* Kunth  
 ชื่อวงศ์ Pontederiaceae  
 ชื่ออื่นๆ ผักสวะ, ผักปอง, ผักกง, ผักคบปอง, ผักบ่ง  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Water hyacinth

ไม้ล้มลุกอายุข้ามปี สูง 0.3- 0.5 เมตร ลำต้นเป็นไหล เรียวกลมทอดไปตามน้ำ แดกกอชูตั้งเหนือน้ำ ลอยตามน้ำ ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบ กลม ภายในมีช่องอากาศมาก ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่หรือรูปหัวใจหรือรูปคล้ายไต กว้าง 8-12 เซนติเมตร ยาว 11-15 เซนติเมตร โคนเว้ารูปหัวใจหรือมน ปลายแหลม ขอบเรียบ ด้านหลังใบและด้านท้องใบสีเขียว ผิวใบมัน เนื้อใบหนา ดอกช่อเชิงลด สีม่วงคราม ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ดอกย่อย สีม่วงคราม เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร กลีบรวม จำนวน 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง มีสองขนาด รูปรีกว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร หนึ่งกลีบใหญ่มีสีเหลืองตรงกลาง ปลายแหลม เนื้อกลีบบาง เกสรเพศผู้ จำนวน 6 อัน ยาวไม่เท่ากัน ยาว 1-3 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาวที่โคนปลายสีม่วง มีขน อับเรณูสีม่วงเข้ม เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร สีเขียว ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรพองออก ผลาเซนตาดิดรอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง แก่แล้วแตก

ชื่อ แพร่เซียงไฮ้

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Portulaca grandiflora* Hook.f.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Portulacaceae

ชื่ออื่นๆ สาวน้อยคั่นสาย, แดงสวรรค์, ดอกผักเบี๋ย, ผักเบี๋ยฝรั่ง

ชื่อภาษาอังกฤษ Moss rose, Sunplant, Portulaca rose

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 0.2 เมตร ลำต้นอวบน้ำ สีเขียวอมแดง ทอคนอนตามพื้นดิน แดกกิ่งชูส่วนยอดค้ำขึ้น ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบไม่มี มีขนสีขาวที่ซอกใบ แผ่นใบรูปไข่กลับ กว้าง 0.5-0.8 เซนติเมตร ยาว 1.8-2.5 เซนติเมตร โคนมน ปลายมน ขอบจักเป็นฟันเลื่อยละเอียด เนื้อใบอวบน้ำ ด้านหลังใบและด้านท้องใบสีเขียว ผิวใบเกลี้ยง ดอกช่อกระจุก สีขาว สีแดง สีเหลือง สีชมพู ออกที่ปลายยอด ก้านช่อดอกสั้นมากหรือไม่มี ดอกย่อย เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียว จำนวน 2 กลีบ รูปไข่ โค้งเหมือนกลีบบัว กว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร เนื้อบาง กลีบดอก จำนวน 5 กลีบถึงจำนวนมากเรียงซ้อนเหลื่อมกัน รูปไข่กลับ กว้างประมาณ 1.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายเว้าคั่น เนื้อกลีบบาง เกสรเพศผู้ จำนวนมาก ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร ก้านเกสรและอับเรณูสีเหลืองเข้ม เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 1 ช่อง รังไข่ใต้วงกลีบ ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเหลือง ยอดเกสรเรียวแยกเป็น 5 เส้นม้วนโค้งลง พลาเซนตาติดที่ฐาน ผลชนิดแห้ง แดกแบบผ่าเปิด

ชื่อ ก้างเต๋น

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Canthium glabrum* Blume

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Rubiaceae

ชื่ออื่นๆ เขากวาง, หูเสือ

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 0.5 เมตร ต้นสีเขียว กลม มีขนสั้น อวบน้ำ แดกกิ่งชูช่อดอกค้ำขึ้น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบไม่มี แผ่นใบรูปรี กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร โคนรูปกลม ปลายแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบบางนุ่ม ด้านหลังใบสีเขียว เกลี้ยง ด้านท้องใบสีแดง มีขนขาวปกคลุมหนาแน่น เส้นใบชัดเจน ดอกช่อเชิงหลั่น สีส้ม ออกที่ซอกก้านใบใกล้ยอด ก้านช่อดอก ยาว 3-4 เซนติเมตร มีขนสีขาว อวบน้ำ ดอกย่อย สีส้ม เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีส้ม รูปหลอด ปลายแหลม 5 แฉก ยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลือง รูปหลอด โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีขนสีขาวปกคลุม ปลายกลีบรูปกลม ปลายแหลม เนื้อบาง เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ยาว

ประมาณ 1.3 เซนติเมตร ก้านชูอับเรณูสีเหลือง ติดที่โคนหลอดของกลีบดอก เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 2 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร สีเขียว มีขนสีขาวและมีเนื้อเยื่อสีเหลืองยื่นขึ้นมาจากฐานรองดอกหุ้มรอบโคน ก้านเกสรสีเขียว ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉก พลาเซนตาติดตามแนวตะเข็บ

ชื่อ พริกชี้หนู

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Capsicum frutescens* L. var. *frutescens*

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Solanaceae

ชื่ออื่น ๆ ดีปลี, ดีปลีจีน, พริกจีน, ปะแกว, พริก, พริกแค้, พริกแค้, พริกแค้หนู, พริกนก, มะระดี, มือชาชีชู, มือสำโท, หมักเพ็ด

ชื่อภาษาอังกฤษ Cayenne pepper

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 0.75-1 เมตร ต้นสีเขียว เป็นเหลี่ยม มีขนเบาบาง แฉกกิ่งเหนือโคนต้นแผ่บานออก เป็นพุ่มโปร่งบริเวณยอด ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปรี กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 4.5-6 เซนติเมตร โคนเฉียง ปลายแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย เนื้อใบบาง ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกเดี่ยวสีขาว ออกที่ซอกก้านใบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ก้านดอกชูตั้ง สีเขียว ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปถ้วย ปลายเว้าตื้นๆ 5 แฉก ยาว 0.3-0.4 เซนติเมตร เกสรตัวผู้ กลีบดอกสีขาว จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นกลีบ รูปไข่ กว้าง 0.3-0.4 เซนติเมตร ยาว 0.6-0.8 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อบาง เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ก้านชูอับเรณูสีขาว ติดที่รอยแยกของกลีบดอก อับเรณูสีเขียวเข้ม ละอองเรณูสีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 2 ช่อง รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร รังไข่สีเขียว ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรเรียวแหลม สีเขียวอ่อน พลาเซนตาออบแกนร่วม ผลชนิดสด มีเนื้อหลายเมล็ด รสเผ็ด สีเขียวและแดงเมื่อแก่

ชื่อ บัวบก

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Centella asiatica* (L.) Urb.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Umbelliferae (Apiaceae)

ชื่ออื่นๆ ผักแว่น, ผักหนอก, ปะหนะเอชาเด้าะ

ชื่อภาษาอังกฤษ Asiatic pennywort, Tiger herbal

ไม้ล้มลุกอายุหลายฤดู ลำต้นสีเขียวทอคนอนตามพื้นดิน ชอบที่ชื้นแฉะ แฉกรากฝอยตามข้อ ใบเดี่ยว ออกสลับ ชูตั้งขึ้น ก้านใบยาว 8-10 เซนติเมตร สีเขียว อวบน้ำ แผ่นใบรูปไข่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 เซนติเมตร โคนเว้ารูปหัวใจ ปลายมน ขอบหยักมน ด้านหลังใบและด้านท้องใบสีเขียว เส้นใบชัดเจน ดอกช่อกระจุก สีม่วงอ่อน ดอกย่อย 2-3 ดอกต่อช่อ ออกที่ซอกใบ ดอกย่อยเมื่อบาน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียว รูปถ้วย ขาวประมาณ 0.35 เซนติเมตร คิดจนถึงผลแก่ กลีบดอก จำนวน 4 กลีบ เมื่อกลิบบาง เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ขาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว อับเรณูสีม่วงเข้ม เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ผลชนิดแห้ง แตกได้

ชื่อ ขอบชะนาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pouzolzia pentandra* Benn.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Urticaceae

ชื่ออื่นๆ หญ้าหนอนคาช, เปลือกมีนดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นทอคนอนขนานพื้นดิน ชูส่วนยอดขึ้น สูงประมาณ 0.3 เมตร ต้นกลม สีเขียวปนม่วง มีขนสีขาว ใบเดี่ยว ออกสลับ ก้านใบยาว 0.7-1.2 เซนติเมตร กลมมีขนสีขาว แผ่นใบรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 1.2-1.8 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร โคนมน ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบบาง ด้านหลังใบสีเขียว ด้านท้องใบสีม่วง มีขนที่เส้นใบ ดอกช่อซี่ร่ม ออกที่ซอกก้านใบ สีแดง ไม่มีก้านช่อดอก ช่อดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ช่อดอกเพศเมียมักอยู่ที่ปลายกิ่ง ช่อดอกเพศผู้อยู่ที่ส่วน โคนของกิ่ง ดอกย่อยเพศผู้ สีแดง กลีบเลี้ยงสีแดง จำนวน 4 กลีบ รูปรี ขาวประมาณ 0.1 เซนติเมตร ด้านนอกมีขนสีขาว กลีบดอกไม่มี เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ขาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ก้านเกสรและอับเรณูสีขาว ดอกย่อยเพศเมีย สีแดง กลีบเลี้ยงสีแดง จำนวน 2 กลีบ ขาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร ด้านนอกมีขนสีขาว กลีบดอกไม่มี เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 1 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ขาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ก้านเกสรเป็นพู่ขนสีขาว ยาว 0.3-0.4 เซนติเมตร พลาเซนตาที่ฐาน ผลชนิดแห้งเมล็ดล่อน

ชื่อ ข่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Alpinia galanga* (L.) Milld.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Zingiberaceae

ชื่ออื่นๆ ข่าดาแดง, ข่าหยวก, ข่าหลวง, ญากกโรหิณี, สะเออเตย, สะเออเซย

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน แดงใบชูขึ้นเหนือดิน สูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยวสีเขียว ออกสลับ ก้านใบเป็นกาบหุ้มซ้อนกัน ยาว 50-75 เซนติเมตร กลม กิ่งแข็ง แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 7-11 เซนติเมตร ยาว 20-40 เซนติเมตร โคนรูปกลม ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ด้านหลัง และด้านท้องใบสีเขียว ดอกช่อกระจະ สีขาวมีประสีม่วงแดง ออกที่ยอด ช่อดอกยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ใบประดับรูปไข่ ดอกย่อย กลีบเลี้ยงสีขาวนวล เป็นหลอด ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาวนวล เป็นหลอดปลายแยกเป็น 3 กลีบ รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 2 อัน อันหนึ่งเปลี่ยนเป็นคล้ายกลีบดอกขนาดใหญ่ รูปไข่ กลีบกว้าง สีขาวมีลายเส้นสีน้ำตาล โคนรูปร่างรูปท่อนเรือ เกสรเพศผู้ที่เหลือจำนวน 1 อัน ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร ชูตั้งขึ้น ส่วนปลายโค้งลงเล็กน้อย ก้านเกสรและอับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อง รังไข่ได้วงกลีบ ก้านเกสรสีเหลือง ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายแผ่รูปปากแตร โกล่งุ้ม ส่วนปลายจะถูกอับเรณูครึ่งไว้ พลาเซนทารอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง รูปกลม

ชื่อ	ข่าน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Alpinia nigra</i> (Gaertn.) Burt
ชื่อพ้อง	<i>A. allughas</i> Roscoe
ชื่อวงศ์	Zingiberaceae
ชื่ออื่นๆ	กะลา, เร่ว, เร่วน้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ -	

ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน แดงใบชูขึ้นเหนือดิน เป็นพุ่มกลม สูงประมาณ 1 เมตร กลิ่นหอม ใบเดี่ยวสีเขียว ออกสลับ ก้านใบเป็นกาบหุ้มซ้อนกัน แผ่นใบรูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร โคนรูปกลม ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ด้านหลังและด้านท้องใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกช่อกระจະ สีขาวมีประสีม่วงแดง ออกที่ยอด ช่อดอกยาวประมาณ 8 เซนติเมตร ใบประดับรูปรี ดอกย่อย กลีบเลี้ยงสีขาวนวล เป็นหลอด ปลายแผ่บาน เนื้อบาง ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว เป็นหลอดปลายแยกเป็น 3 กลีบ รูปรี กว้าง 0.7-1.2 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร ปลายแหลม เนื้อกลีบบาง เกสรเพศผู้ 2 อัน อันหนึ่งเปลี่ยนเป็นคล้ายกลีบดอกขนาดใหญ่ รูปไข่กลับกว้าง สีแดงเข้มถึงดำ ปลายสีเหลืองเข้ม โคนรูปท่อนเรือ เกสรเพศผู้ที่เหลือจำนวน 1 อัน ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ชูตั้งขึ้น ส่วนปลายโค้งลงเล็กน้อย ก้านเกสรและอับเรณูสีขาว เกสรเพศเมียประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อง รังไข่ได้วงกลีบ ก้านเกสรสีขาว ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร ปลายแผ่รูปปากแตร โกล่งุ้ม ส่วนปลายจะถูกอับเรณูครึ่งไว้ พลาเซนทารอบแกนร่วม ผลชนิดแห้ง รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร เมื่อแก่สีส้มเข้ม ไม้แตก

### ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (CLIMBER)

ชื่อ รางจืด  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Thunbergia laurifolia* Lindl.  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Acanthaceae  
 ชื่ออื่นๆ กำล้างช้างเผือก, ขอบชะนาง, คาย, น้านอง, เครือเขาเขียว, ทิดพุด, ยาเขียว, ข้าแฉ้, รางเย็น, คูเหว่า, แอคแอ, จอลอคิเออ, ชั่งกะ, ปั้งกะละ, พอหน่อเตอ  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้เถาขนาดกลางอายุหลายฤดู ลำต้นสีเขียว ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ก้านใบยาว 2-4 เซนติเมตร โคนก้านใบมักม้วนพันกิ่ง แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 3.5-7 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร โคนมน ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกช่อแยกแขนง สีม่วงคราม ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาว 1-2 เซนติเมตร ดอกย่อยเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 เซนติเมตร รูปกรวย ใบประดับสีเขียวประแดง กลีบเลี้ยงรูปถ้วย กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร กลีบดอกสีม่วงคราม รูปแตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาว 4-5 เซนติเมตร ไม้คัตน เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน อับเรณูสีม่วง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ขอบเกสรแผ่กว้างคล้ายปากแตร ผลชนิดแห้ง รูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ส่วนปลายสอบแหลมเป็นจางงอย ยาว 2-3 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก จากจางงอยส่วนบน

ชื่อ พลูด่าง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Epipremnum aureum* Engl.  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Araceae  
 ชื่ออื่นๆ พลูช้าง, พลูฝรั่ง, ราชนิหินอ่อน, ราชนิสีทอง

ชื่อภาษาอังกฤษ Ivy-arum, Pothos vine, Taro vine

ไม้เลื้อย ลำต้นสีเขียวอมเหลือง รากฝอยออกบริเวณข้อใช้ยึดเกาะ ข้อโป่งนูน ใบเดี่ยว ออกสลับ ก้านใบยาว 5-8 เซนติเมตร โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น แผ่นใบรูปหัวใจ กว้าง 6-10 เซนติเมตร ยาว 10-16 เซนติเมตร โคนรูปหัวใจ ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ แผ่นใบมีหลายสี สีเหลืองทองทั้งใบ เรียกชื่อว่า ราชนิสีทอง สีขาวปนเขียว เรียกว่า ราชนิหินอ่อน สีเขียว หรือสีเขียวปนเหลือง พบทั่วๆ ไป เรียกชื่อว่าพลูด่าง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในอาคาร

ชื่อ พลูแจก  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Monstera deliciosa* Liebm.  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Araceae  
ชื่ออื่นๆ พลูฉีก  
ชื่อภาษาอังกฤษ Ceriman

ไม้เถาค่อนข้างอวบน้ำ ลำต้นสีเขียว รากฝอยออกบริเวณข้อใช้ยึดเกาะ มียางใสทุกส่วนของต้น ใบเดี่ยว ออกสลับ ก้านใบยาว 11-15 เซนติเมตร โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น แผ่นใบรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 7-11 เซนติเมตร ยาว 13-16 เซนติเมตร โคนมนหรือเว้าตื้นๆ หรือตัดตรง ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่น ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ผิวเกลี้ยง แผ่นใบ มีรูรูปร่างต่างๆ ทั่วแผ่นใบ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในอาคาร

ชื่อ พลูช้าง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Seindapsus officinalis* Schott  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Araceae  
ชื่ออื่นๆ หีควาย, เครื่องเขี้ยว  
ชื่อภาษาอังกฤษ

ไม้เถาค่อนข้างอวบน้ำ ลำต้นสีเขียวเหลือง รากฝอยออกบริเวณข้อใช้ยึดเกาะหลักเพื่อทำให้ลำต้นชูสูงขึ้น มียางใสทุกส่วนของต้น ใบเดี่ยว ออกสลับ ก้านใบยาว 10-15 เซนติเมตร โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 15-23 เซนติเมตร ยาว 25-35 เซนติเมตร โคนตัดตรง ปลายเรียวแหลมหรือมน ขอบเรียบหรือเว้าเหมือนขอบดุกฉีก ด้านหลังใบสีเขียวเหลืองเป็นลาย ด้านท้องใบเหมือนกัน ผิวเกลี้ยง เป็นมัน เนื้อใบหนา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับให้เกาะตามต้นไม้ใหญ่ หรือผนังอาคาร

ชื่อ จันทร์กระจ่างฟ้า  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Macfadyena unguis-cati* L.  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Bignonaceae  
ชื่ออื่นๆ -  
ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้เลื้อย ลำต้นกลมเล็ก กิ่งอ่อนข้างเหนียว สีเขียว มียางขาวขุ่น ใบเดี่ยวออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปรี กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร โคนมน ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนาเป็นมัน ด้านบนสีเขียวเข้มกว่าด้านล่าง ดอกช่อกระจุกด้านเดียวช้อน ดอกสีเหลือง ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาว 2-3 เซนติเมตร ดอกย่อย เมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง จำนวน 5 กลีบ เป็นเส้นสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน กลีบดอกสีเหลือง รูปกรวยคอดสองช่วง ปลายบานแยกเป็น 5 กลีบ เรียงเหลื่อมซ้อนกัน กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ สีเหลือง จำนวน 5 อัน ติดที่กอดคอดของหลอดกลีบ รูปลูกศร โคนก้านมีขนยาว ปลายเป็นเส้นยาวห่อหุ้มยอดเกสรเพศเมีย เกสรเพศเมียประกอบด้วย 2 พูแยกเป็นอิสระ ก้านเกสรเชื่อมติดกัน รังไข่เหนือวงกลีบ สีเขียว ยอดเกสรเป็นก้อนมีน้ำเหนียว

ชื่อ เล็บมือนาง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Quisqualis indica* L.  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Combretaceae  
 ชื่ออื่นๆ จะมั่ง, จ้ำมั่ง, มะจิมั่ง, ไข่หม่อง, อะดอเน็ง  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Rangoon creeper, Drunken sailor

ไม้เถาขนาดใหญ่ ลำต้นกลม เกลี้ยง สีน้ำตาล แตกกิ่งมาก ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ก้านใบยาว 0.8-1 เซนติเมตร แผ่นใบรูปรี กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 9-11 เซนติเมตร โคนมน ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบคายมือและเหนียว ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกช่อเชิงหลั่น สีแดง สีมชมพู ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาว 0.5-1 เซนติเมตร ดอกย่อย เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียวอ่อนเป็นหลอด ยาว 3-4 เซนติเมตร ปลายจักแหลมเป็น 5 แฉก มีขนสีขาวทั้งด้านนอกและด้านใน กลีบดอกสีขาว สีมชมพูและสีแดง จำนวนมาก รูปขอบขนาน กว้าง 0.4-0.5 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ปลายมน มีขนสีขาวทั้งด้านในและด้านนอก เกสรเพศผู้เปลี่ยนรูปคล้ายกลีบดอก จำนวน 2 อัน อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 1 พู 1 ช่อง รังไข่ได้วงกลีบ ก้านเกสรสีเขียวเชื่อมติดกับหลอดกลีบเลี้ยง ปลายชูเหนือกลีบดอก ยอดเกสรแผ่บานมีน้ำเหนียว พลาเซนตาที่ยึด

ชื่อ ไบระบาด  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Argyreia nervosa* (Burm.f.) Bojer  
 ชื่อพ้อง *A. speciosa* (L.f.) Sweet

ชื่อวงศ์ Convolvulaceae  
 ชื่ออื่นๆ ผักกระบาด, เมืองมอญ  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้เถาขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 10 เมตร ลำต้นและกิ่งมีขนนุ่มสีขาว มียางขาว ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบยาว 10-15 เซนติเมตร มีขนขาวหนาแน่น แผ่นใบรูปหัวใจ กว้าง 10-18 เซนติเมตร ยาว 15-25 เซนติเมตร โคนรูปหัวใจ ปลายแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่นน้อยๆ เนื้อใบนุ่ม ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม ด้านท้องใบสีขาว มีขนละเอียดสีขาวปกคลุมหนาแน่น ดอกช่อกระจุกช้อน สีม่วง ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตร ดอกย่อยคล้ายดอกผักบุ้ง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-7 เซนติเมตร ใบประดับสีขาวอมเขียวหุ้มโคนดอก รูปใบหอก กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร โคนตัด ปลายเป็นหาง ขอบเป็นคลื่น กลีบเลี้ยง จำนวน 4-5 กลีบ เรียง 2 วง สีขาวอมเขียว ขนาดไม่เท่ากัน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม มีขนสีขาวด้านนอก ด้านในเกลี้ยงเป็นมัน กลีบดอกสีม่วงคล้ายดอกผักบุ้ง รูปปากแตร ปลายบานพับเป็นจีบ ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร เนื้อหนา ด้านนอกสีขาวมีขนนุ่ม ด้านในสีม่วง ร่วงง่าย เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาว 2 อัน ตัน 3 อัน ยาว 2-2.5 เซนติเมตร อับเรณูสีขาว เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 5 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ก้านเกสรสีขาว ยาวประมาณ 3.2 เซนติเมตร ยอดเกสรพองเป็นเนื้อคล้ายกำมะหยี่ สีขาว พลาเซนทารอบแกนกลาง ผลแห้ง แก่แล้วแตก

ชื่อ ผักตำลึง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Coccinia grandis* (L.) Voigt  
 ชื่อพ้อง *C. indica* Wight & Am.  
 ชื่อวงศ์ Cucurbitaceae  
 ชื่ออื่นๆ ผักแคบ, แคเตี๊ยะ  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้เถา ลำต้นเล็ก สีเขียวเป็นร่อง เกลี้ยง มียางใส ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามโดยที่ใบข้างหนึ่งเปลี่ยนเป็นหนวดใช้ยึดเกาะ ก้านใบยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร แผ่นใบรูปหัวใจ กว้าง 5-6.5 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร โคนรูปหัวใจ ปลายแหลมเป็นติ่ง ขอบมีหนามเล็กจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบบาง ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกเดี่ยวสีขาว แยกเพศ ออกที่ซอกก้านใบ ก้านดอกยาว 3-4 เซนติเมตร ดอกเพศผู้ เมื่อบานผ่าศูนย์กลาง 5-6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียว รูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก ยาว 0.8-1 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว มีลายเส้นสีเขียว รูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่ ปลายแหลม เนื้อบาง ด้านในมีขน เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ก้านเกสรสีเขียว ปลายแผ่รูปนิ้วมือ อับเรณูสีเหลือง ดอกเพศเมีย เหมือนดอกเพศผู้แต่ไม่มีเกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 1 ช่อง

ชื่อวงศ์ Convolvulaceae  
 ชื่ออื่นๆ ผักกระบาด, เมืองมอน  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้เถาขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 10 เมตร ลำต้นและกิ่งมีขนนุ่มสีขาว มียางขาว ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบยาว 10-15 เซนติเมตร มีขนขาวหนาแน่น แผ่นใบรูปหัวใจ กว้าง 10-18 เซนติเมตร ยาว 15-25 เซนติเมตร โคนรูปหัวใจ ปลายแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่นน้อยๆ เนื้อใบนุ่ม ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม ด้านท้องใบสีขาว มีขนละเอียดสีขาวปกคลุมหนาแน่น ดอกช่อกระจุกซ้อน สีม่วง ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตร ดอกย่อยคล้ายดอกผักบุ้ง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-7 เซนติเมตร ใบประดับสีขาวอมเขียวหุ้มโคนดอก รูปใบหอก กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร โคนคอด ปลายเป็นหาง ขอบเป็นคลื่น กลีบเลี้ยง จำนวน 4-5 กลีบ เรียง 2 วง สีขาวอมเขียว ขนาดไม่เท่ากัน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม มีขนสีขาวด้านนอก ด้านในเกลี้ยงเป็นมัน กลีบดอกสีม่วงคล้ายดอกผักบุ้ง รูปปากแตร ปลายบานพับเป็นจีบ ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร เนื้อหนา ด้านนอกสีขาวมีขนนุ่ม ด้านในสีม่วง ร่วงง่าย เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาว 2 อัน สั้น 3 อัน ยาว 2-2.5 เซนติเมตร อับเรณูสีขาว เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 5 ช่อง รั้งไข่ม้วนองกลีบ ก้านเกสรสีขาว ยาวประมาณ 3.2 เซนติเมตร ยอดเกสรพองเป็นเนื้อคล้ายกำมะหยี่ สีขาว พลาเซนทารอบแกนกลาง ผลแห้ง แก่แล้วแตก

ชื่อ ผักคำสิง  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Coccinia grandis* (L.) Voigt  
 ชื่อพ้อง *C. indica* Wight & Arn.  
 ชื่อวงศ์ Cucurbitaceae  
 ชื่ออื่นๆ ผักแคบ, แคเคี้ยว  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้เถา ลำต้นเล็ก สีเขียวเป็นร่อง เกลี้ยง มียางใส ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม โดยที่ใบข้างหนึ่งเปลี่ยนเป็นหวดใช้ยึดเกาะ ก้านใบยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร แผ่นใบรูปหัวใจ กว้าง 5-6.5 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร โคนรูปหัวใจ ปลายแหลมเป็นติ่ง ขอบมีหนามเล็กจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบบาง ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกเดี่ยวสีขาว แยกเพศ ออกที่ซอกก้านใบ ก้านดอกยาว 3-4 เซนติเมตร ดอกเพศผู้ เมื่อบานผ่าศูนย์กลาง 5-6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง สีเขียว รูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก ยาว 0.8-1 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว มีลายเส้นสีเขียว รูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่ ปลายแหลม เนื้อบาง ด้านในมีขน เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ก้านเกสรสีเขียว ปลายแผ่รูปนิ้วมือ อับเรณูสีเหลือง ดอกเพศเมีย เหมือนดอกเพศผู้แต่ไม่มีเกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 1 ช่อง

รังไข่ได้วงกลีบ ก้านเกสร ไม่มี พลาเซนตาตามแนวตะเข็บ ผลสด มีเนื้อหลายเมล็ด

ชื่อ อรพิม  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Bauhinia winittii* Craib  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Leguminosae-Caesalpinioideae  
ชื่ออื่นๆ ก๊วนาง  
ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้เตา กิ่งอ่อนมีมือเกาะ ลำต้นมีขนสีน้ำตาลเข้ม ใบเดี่ยว ออกสลับ ก้านใบยาว 0.7-1 เซนติเมตร แผ่นใบเว้าผ่ากลางเป็นสองซีก ดอกสีขาวใบย่อยสองใบ รูปไข่เบี้ยวๆ ปลายกลม กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร โคนเว้ารูปหัวใจ ปลายมน ขอบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ด้านหลังใบและท้องใบสีเขียวอ่อน ดอกช่อเชิงหลั่น สีขาว ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาว 4-5 เซนติเมตร ดอกย่อยทยอยบานวันละ 1-3 ดอก เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 13-19 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเล็กน้อย สีเขียวน้ำตาล กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร เป็นร่องตามยาวจากโคนถึงปลาย กลีบดอกสีขาว ไม่ติดทน จำนวน 5 กลีบ รูปรี กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบใบจีบ เกสรเพศผู้ จำนวน 10 อัน ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว อับเรณูสีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 1 ช่อ รังไข่เหนือวงกลีบ สีเขียวอ่อน ก้านเกสรสีเขียวอ่อน ยอดเกสรพองเป็นเนื้อหนาสีน้ำตาลเข้ม ผลชนิดแห้ง เป็นฝักแบน ยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร แฉกตามแนวตะเข็บสองข้าง

ชื่อ สวาด  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb.  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Leguminosae-Caesalpinioideae  
ชื่ออื่นๆ หวาด, ต้นหยง, มากาเล้ง, คามัด, บ่าจี้แฮด, มะกาเล้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ Nicker bean, Grey nickers

ไม้เถาขนาดใหญ่ ลำต้นสีเขียวมีหนามแข็งโค้งลงคล้ายหนามกุหลาบ ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่สองชั้น ออกเวียนสลับ ก้านใบยาว 8-10 เซนติเมตร ก้านใบและแกนกลางใบมีหนามแข็ง ใบย่อยรูปรี กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 2.5-4.5 เซนติเมตร โคนเฉียง ปลายเป็นติ่งแหลม ขอบเรียบ ด้านหลังใบและท้องใบสีเขียวเข้ม มีขนสีขาวที่เส้นกลางใบ ดอกช่อเชิงลด สีเหลืองออกเขียว ออกที่

ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาว 3-12 เซนติเมตร มีหนามแหลมแข็ง ดอกย่อย เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ใบประดับสีเขียวเป็นเส้นรูปหัวใจกลับ ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร มีขนขาวนุ่ม หลอดรวงก่อนดอกบาน กลีบเลี้ยง จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน รูปไข่กลับ กว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลหนาแน่นทั้งด้านบนและด้านใน กลีบดอกสีเหลือง จำนวน 5 กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 0.3-0.4 เซนติเมตร ยาว 0.8-0.9 เซนติเมตร ปลายแหลม มีขนขาวที่โคนกลีบด้านใน เกสรเพศผู้ จำนวน 10 อัน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน มีขนขาว อับเรณูสีดำ เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 1 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ มีขนสีขาวยาวก้านเกสรไม่มี ยอดเกสรเปิดเป็นช่อง ผลชนิดแห้ง ฝักแบน เปลือกเป็นหนามแหลม กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร แตกตามแนวตะเข็บสองข้าง

ชื่อ เถาวัลย์เปรียง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Derris scandens* (Roxb.) Benth.  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Leguminosae-Papilionoideae  
ชื่ออื่นๆ เครือเขาหนัง, เถาตาปลา, พานไสน  
ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้เถาขนาดใหญ่ ยอดอ่อนมีขนนุ่ม ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกสลับ ก้านใบยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ใบย่อยรูปรี กว้าง 1-2.5 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร โคนมน ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกช่อเชิงลด สีขาว ออกที่ซอกก้านใบใกล้ยอด ก้านช่อดอกยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ดอกย่อยรูปดอกถั่ว เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีม่วงอมแดง ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ติดทนถึงผล กลีบดอกสีขาว จำนวน 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน 3 ระดับ กลีบใหญ่รูปไข่กลับ กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร โคนสอบเป็นก้าน ปลายมน ขอบขี้ขุย กลีบที่เหลือจับเป็นคู่ ลักษณะเหมือนกลีบใหญ่ต่างกันที่ขนาด เกสรเพศผู้ จำนวน 10 อัน ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร เชื่อมติดกัน 9 อัน อีก 1 อันแยกเป็นอิสระ อับเรณูสีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ มีขนสีน้ำตาล ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรเปิดเป็นช่อง พลาเซนตาแนวเดือย ผลชนิดแห้ง ฝักแบน กว้าง 0.9-1.3 เซนติเมตร ยาว 3.5-8 เซนติเมตร แตกตามแนวตะเข็บสองข้าง

ชื่อ อัญชัน  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Clitoria ternatea* L.  
ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Leguminosae-Papilionoideae  
 ชื่ออื่นๆ ถั้วซันป่า, ถั้วซันป่า, หัวพะยาว, หมากแปบผี, แดงซัน, ถั้วซัน  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Mussel-shell creeper, Blue pea, Butterfly pea

ไม้เถาขนาดเล็ก ลำต้นสีเขียว กลมเหนียว มีขนสีขาว ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกสลับ  
 ก้านใบยาวประมาณ 2 เซนติเมตร มีขนสีขาว ใบย่อยรูปรี กว้าง 1.8-2.5 เซนติเมตร ยาว 2.7-4  
 เซนติเมตร โคนมน ปลายเป็นคี่แหลม ขอบเรียบ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีขนสีขาว  
 ดอกเดี่ยว สีน้ำเงินหรือสีขาวหรือสีม่วงอ่อน ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 0.5  
 เซนติเมตร มีขนสีขาว เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ใบประดับสีเขียวรูปกาบหอย  
 แครง กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ด้านนอกมีขน กลีบเลี้ยงสีเขียว  
 เป็นหลอด ปลายจักลึกเป็น 5 กลีบ ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ติดทนถึงผล กลีบดอก จำนวน 5  
 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน 3 ระดับ กลีบใหญ่รูปไข่กลับ กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.8  
 เซนติเมตร โคนสอบเป็นก้าน ปลายมน ขอบขั้ว กลีบที่เหลือจับเป็นคู่ ลักษณะเหมือนกลีบใหญ่ต่าง  
 กันที่ขนาดและสี เกสรเพศผู้ มีจำนวน 10 อัน ยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร เชื่อมติดกัน 8 อัน อีก 2  
 อันแยกเป็นอิสระ อันเรณูสีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ มี  
 ขนสีขาว ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรเปิดเป็นช่อง พลาเซนตาแนวเดียว ผลชนิดแห้ง ฝักแบน กว้าง  
 ประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร แตกตามแนวตะเข็บสองข้าง

ชื่อ ถั้วซันป่า  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dendrophthoe pentandra* (L.) Miq.  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Loranthaceae  
 ชื่ออื่นๆ -  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้อากาศอาศัยเกาะตามกิ่งของไม้ยืนต้น สีเขียวเทา มีรูช่องอากาศเป็นจุดสีขาวกระจายทั่วกิ่ง  
 ใบเดี่ยว ออกสลับ ก้านใบยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่หรือรูปรี กว้าง 3-4 เซนติเมตร  
 ยาว 7-8 เซนติเมตร โคนรูปไข่ ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบหนากรอบ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่า  
 ด้านท้องใบ ดอกช่อแยกแขนง สีส้มอมเขียว ออกที่ซอกก้านใบ ดอกย่อยเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง  
 ประมาณ 1.8 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง จำนวน 5 กลีบ ขนาดเล็กเป็นเกือก สีเขียวขอบสีน้ำตาล มีขนสั้น  
 ปกคลุม กลีบดอก จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก รูปขอบขนาน กว้าง 0.1-0.2  
 เซนติเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร ปลายแหลม ด้านนอกสีเขียว ด้านในสีส้มสด เนื้อหนา เกสรเพศผู้  
 จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเขียว อันเรณูสีส้ม เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย

5 พู 5 ช่อ รังไข่ได้วงกลีบ ก้านเกสรสีเขียว ยอดเกสรพองเป็นเนื้อหนาสีเขียว พลาเซนตาติครอบ  
แกนร่วม

ชื่อ พู  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Piper betle* L.  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Piperaceae  
ชื่ออื่นๆ ชีเก๊า

ชื่อภาษาอังกฤษ Betel vine, Betel pepper

ไม้เถาเนื้อแข็ง ลำต้นสีเขียว รากฝอยออกบริเวณข้อใช้ยึดเกาะ ข้อโป่งนูน ใบเดี่ยว ออกสลับ  
ก้านใบยาวประมาณ 3 เซนติเมตร แผ่นใบรูปหัวใจ กว้าง 8-12 เซนติเมตร ยาว 12-16 เซนติเมตร  
โคนรูปหัวใจ ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ผิวเกลี้ยงเป็นมัน มี  
กลิ่นและมีรสเผ็ด ดอกช่อหางกระรอกสีขาวเหลือง ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 3  
เซนติเมตร ดอกย่อยขนาดเล็กอัดแน่นเป็นรูปทรงกระบอก ดอกแยกเพศ ผลสด กลมเล็กเบียดกันอยู่  
บนแกน

ชื่อ พริกไทย  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Piper nigrum* L.  
ชื่อพ้อง -  
ชื่อวงศ์ Piperaceae  
ชื่ออื่นๆ พริกน้อย  
ชื่อภาษาอังกฤษ Pepper

ไม้เถาเนื้อแข็ง ลำต้นสีเขียว รากฝอยออกบริเวณข้อใช้ยึดเกาะ ข้อโป่งนูน ใบเดี่ยว ออกสลับ  
ก้านใบยาวประมาณ 3 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 8-11 เซนติเมตร โคนมน  
ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ผิวเกลี้ยงเป็นมัน เนื้อใบค่อนข้าง  
หนา ดอกช่อหางกระรอกสีขาวแกมเขียว ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร  
ดอกย่อยขนาดเล็กอัดแน่นเป็นรูปทรงกระบอก ดอกสมบูรณ์เพศ ผลสด กลมเล็กเบียดกันอยู่บนแกน  
ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดง รสเผ็ดร้อน

ชื่อ ดีปลี  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Piper retrofractum* Vahl

ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Piperaceae  
 ชื่ออื่นๆ ดีปลีเชือก  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Long pepper

ไม้เถา ลำต้นสีเขียว รากฝอยออกบริเวณข้อใช้ยึดเกาะ ข้อโปร่งนูน ใบเดี่ยว ออกสลับ ก้านใบยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร โคนมน ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่น ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ผิวเกลี้ยงเป็นมัน เนื้อใบบางเหนียว ดอกช่อเชิงลด สีเขียว ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ดอกย่อยขนาดเล็กอัดแน่นเป็นรูปทรงกระบอก ดอกแยกเพศ ผลสดเบียดกันอยู่บนแกน ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดง รสเผ็ดร้อน

ชื่อ โลกกระออม  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cardiospermum halicacabum* L.  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Sapindaceae  
 ชื่ออื่นๆ โพออม, ลูกลิบเครือ, วีวี  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Balloon vine, Heart pea

ไม้เถาขนาดเล็กอายุดูเดียว ลำต้นสีเขียว กลมเหนียว มีมือเกาะปลายมีวงงอ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกสลับ ก้านใบยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ใบย่อยรูปสามเหลี่ยมหรือรูปไข่ กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 4-5 เซนติเมตร โคนรูปกลม ปลายแหลม ขอบจัก ด้านหลังใบและด้านท้องใบสีเขียว ดอกช่อเชิงหลั่น สีขาว ออกที่ซอกก้านใบ มีมือเกาะปลายมีวงงอ ก้านช่อดอกยาว 2-3 เซนติเมตร ดอกย่อยเมื่อบานเต็มผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว จำนวน 3 กลีบ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ติดทนถึงผล กลีบดอกสีขาว จำนวน 5 กลีบ เนื้อกลีบบาง ร่วงง่าย เกสรเพศผู้ ก้านเกสรสีขาว อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 พู 3 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ผลชนิดแห้ง แตกได้ รูปทรงกลมแกมสามเหลี่ยม มีเขี้ยวบางๆ สีเขียวหุ้มเป็นถุงพองลม เป็นสัน 3 สัน เมล็ดรูปทรงกลมสีดำ มีขั้วรูปหัวใจสีขาว

ชื่อ มะแว้งเครือ  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Solanum trilobatum* L.  
 ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Solanaceae

ชื่ออื่นๆ แขว้งเคียว

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้เลื้อย สูงประมาณ 3 เมตร ลำต้นสีเขียว มีหนามแหลมโค้งลงคล้ายหนามกุหลาบตามกิ่ง ก้านใบและแกนใบ ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ก้านใบยาว 2-3 เซนติเมตร แผ่นใบรูปกลม กว้าง 2.2-4.5 เซนติเมตร ยาว 2.5-5 เซนติเมตร โคนตัด ปลายแหลม ขอบหยัก เนื้อใบอ่อนค่อนข้างบาง ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีขนรูปดาวประปราย ดอกช่อเชิงหลั่น สีม่วง ออกที่ซอกก้านใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกสั้นมากถึงไม่มี ดอกย่อยเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาวลดหลั่นกัน กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ด้านนอกมีขนรูปดาวห่างๆ ติดทนถึงผล กลีบดอก จำนวน 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบเป็นคลื่น เนื้อกลีบบาง เกสรเพศผู้ จำนวน 5 อัน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร โคนก้านเชื่อมติดกัน อับเรณูสีเหลืองเข้ม มีรูเปิดที่ปลายด้านบน เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 5 พู 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 2.2 เซนติเมตร ก้านเกสรสีขาว ยอดเกสรเรียวแหลมเป็นรูเปิด ผลาเนนดรรอบแกนคั่ว ผลชนิดสด มีเนื้อหลายเมล็ด ผลสุกสีแดง รูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร

ชื่อ เครือพุดสาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cayratia trifolia* (L.) Domin

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์ Vitaceae

ชื่ออื่นๆ เถาคัน, เถาคันขาว

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้เถาขนาดเล็ก ลำต้นสีเขียว มีมือเกาะ ใบประกอบแบบนิ้วมือชนิดสามใบย่อย ออกสลับ ก้านใบยาว 2-5 เซนติเมตร ใบย่อยรูปรีหรือรูปไข่หอก กว้าง 1-4 เซนติเมตร ยาว 2-8 เซนติเมตร โคนรูปติ่ม ปลายเรียวแหลม ขอบจักเป็นฟันเลื่อย เนื้อใบหนา ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกช่อแยกแขนง สีขาว ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาว 5-10 เซนติเมตร ดอกย่อยเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปถ้วย ปลายแยกเป็น 4 กลีบ ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร เนื้ออวบน้ำ ติดทนถึงผล กลีบดอกสีขาวขนาดเล็ก จำนวน 4 กลีบ เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 4 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ผลสุกรูปกลมเป็น เมื่อกัดสีดำ

ชื่อ เพชรสังฆาต

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cissus quadrangularis* L.

ชื่อพ้อง -  
 ชื่อวงศ์ Vitaceae  
 ชื่ออื่นๆ ขึ้นชื่อ, ต้นชะควด, สามร้อยต่อ  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้เลื้อย ลำต้นรูปสามเหลี่ยมเป็นครีบก สีสีเขียว ผิวเรียบ มีรอยคอดบริเวณข้อ ใบเดี่ยว ออกสลับ ก้านใบยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปสามเหลี่ยมหรือรูปไข่ กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร โคนรูปหัวใจ ปลายมน ขอบหยักมน เนื้อใบค่อนข้างหนา ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ตรงข้ามใบมีมือเกาะ ดอกช่อเชิงหลั่น ออกตรงข้ามใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงรูปถ้วย สีเขียว กลีบดอก จำนวน 4 กลีบ รูปไข่ ปลายแหลม ขอบเรียบ ด้านนอกสีเขียวแกมเหลือง โคนกลีบมีแถบสีแดง ด้านในสีขาวแกมเขียว เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ก้านเกสรและอับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบ ก้านเกสรสีเขียว ยอดเกสรเปิดเป็นช่อง ผลชนิดสด รูปกลม

ไม้รอเลื้อย (SCANDENT)

ชื่อ ถิ่นเช่า  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Clinacanthus siamensis* Bremek.  
 ชื่อพ้อง  
 ชื่อวงศ์ Acanthaceae  
 ชื่ออื่นๆ -  
 ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้รอเลื้อยสูงประมาณ 3 เมตร ลำต้นกลม สีเขียว มีขนกระจายห่างๆ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบยาวประมาณ 2 เซนติเมตร แผ่นใบรูปรีขอบขนาน กว้าง 2.5-4.5 เซนติเมตร ยาว 9-14.5 เซนติเมตร โคนมน ปลายเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่น เนื้อใบค่อนข้างหนา ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกช่อเชิงหลั่น สีแดงขอบสีเหลือง ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกไม่มี ดอกย่อยเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ดอกรูปปากเปิด ดอกสีแดง ก้านดอกย่อยสีเขียว ยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร มีขนสีขาวชนิดปลายเป็นค่อม กลีบเลี้ยงสีเขียว จำนวน 4 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน รูปรียาว ปลายแหลม กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.6 เซนติเมตร มีขนสีขาวชนิดปลายเป็นค่อมกระจายหนาแน่นทั้งด้านในและด้านนอก กลีบดอก จำนวน 4 กลีบ รูปปากเปิด 3 กลีบกับ 1 กลีบ ยาวประมาณ 5.5 เซนติเมตร โคนสีแดง ส่วนปลายสีเหลืองเป็นลาย ด้านนอกมีขนสีขาวชนิดปลายเป็นค่อม เกสรเพศผู้ จำนวน 2 อัน ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร โคนเชื่อมติด

กับหลอดกลีบดอก ก้านเกสรสีเหลือง อับเรณูสีเขียว เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 2 ช่อง รังไข่  
เหนือวงกลีบ ก้านเกสรสีเขียว ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร พลาเซนตารอบแกนร่วม

ชื่อ การเวก

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Artabotrys siamensis* Miq.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Annonaceae

ชื่ออื่นๆ กระดังงาป่า, กระดังงาเถา, หนามควายนอน, นมขะนึ้, นมวัว, กระดังงัว

ชื่อภาษาอังกฤษ Artabotrys

ไม้รอเลื้อยขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 20 เมตร แตกกิ่งมาก มีมือเกาะรูปตะขอ มีขนสีน้ำตาล ใบ  
เดี่ยวออกสลับ ก้านใบยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาล แผ่นใบรูปไข่กลับ กว้าง 4-7  
เซนติเมตร ยาว 9-19.5 เซนติเมตร โคนรูปกลม ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบมีขนสีน้ำตาลโดยรอบ  
ด้านหลังใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านท้องใบมีขนสีน้ำตาลที่เส้นใบ ดอกเดี่ยวสีเขียวอมเหลือง ออกที่  
ซอกก้านใบ ก้านดอกยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลหนาแน่น เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง  
6-8 เซนติเมตร กลีบรวมสีเขียว จำนวน 6 กลีบรูปรีฐานแผ่ออกคล้ายกระเปาะผ่าครึ่ง กว้าง 1.1-1.5  
เซนติเมตร ยาว 4-4.5 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อกลีบหนา มีกลิ่นหอม ด้านหลังกลีบ  
และด้านท้องกลีบมีขนสีขาวและสีน้ำตาลสั้นๆ เกสรเพศผู้สีขาวจำนวนมากเรียงซ้อนกันห่อหุ้มรังไข่  
รูปปลอกศร ปลายเป็นติ่งแหลม กว้างประมาณ 0.1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.25 เซนติเมตร อับเรณูสี  
ขาว เกสรเพศเมีย ประกอบด้วยหลายพูแยกเป็นอิสระ แต่ละพูมี 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยอดเกสร  
สีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีดำ พลาเซนตาด้านเดียว ผลกลุ่มชนิดแห้ง รูปทรงกลม แตกซีกเดียว

ชื่อ ตำมะงา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.

ชื่อพ้อง *C. neritifolium* Wall.

ชื่อวงศ์ Labiatae (Lamiaceae)

ชื่ออื่นๆ เขี้ยวงู, ส้มเนรา, สักขรีย่าน, ตำป็นงา, ตำมะลิ่งา, ตำลิ่งา, คากี

ชื่อภาษาอังกฤษ Garden quinine, Seaside clerodendron

ไม้รอเลื้อย สูงประมาณ 3 เมตร แตกกิ่งมาก ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบยาว 1-  
1.5 เซนติเมตร สีน้ำตาลแดง แผ่นใบรูปไข่หรือรูปรี กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5.5-8 เซนติเมตร โคน  
มน ปลายแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนาและเหนียว ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มี  
ขนชนิดด้อมทำให้มีกลิ่นเฉพาะ ดอกช่อกระจุกซ้อน สีขาว ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาว 3-5

เซนติเมตร ดอกย่อยสีขาว เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปถ้วย ปลายเว้าตื้น 5 แฉก ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ติดทนถึงผล กลีบดอกสีขาว เป็นหลอดเล็ก ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ก้านเกสรและอับเรณูสีม่วง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 4 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 5.5 เซนติเมตร ก้านเกสรสีม่วง โคนขาว ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉก พลาเซนตารอบแกนร่วม ผลชนิดสด มีเนื้อหลายเมล็ด เปลือกของผลมีต่อมน้ำนม

ชื่อ ชื่อแมง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gmelina philippensis* Cham.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Labiatae (Lamiaceae)

ชื่ออื่นๆ ข้าวจี่, कांगแมว, จิงจาย, จิ้งจ้อ, ช้อแมว, ยวงขนุน, เล็บแมว, ส้มแมว, หางกระรอกแดง, ปะงางอ

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้รอเลื้อย สูงประมาณ 10 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล แตกกิ่งมาก ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบบิด สีน้ำตาล ยาว 1-1.5 เซนติเมตร หูใบเป็นหนามแหลมและยาว แผ่นใบรูปรี กว้าง 2.5-6 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร โคนมน ปลายแหลม ขอบหยัก เนื้อใบค่อนข้างหนา ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ผิวเกลี้ยง ดอกช่อหางกระรอก สีเหลืองเขียว ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอก ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลหนาแน่น ดอกย่อยสีเหลืองเข้ม เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ก้านดอกไม่มี ใบประดับสีเขียวรูปรี โคนเป็นท้องเรียว กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร เส้นใบสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปถ้วย กว้างประมาณ 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลสั้นๆ กลีบดอกสีเหลืองเข้ม รูปปากเปิด จำนวน 4 กลีบ กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5.5 เซนติเมตร โคนสอบเป็นก้าน เนื้อหนา ด้านนอกมีขนสีน้ำตาลสั้น เกสรเพศผู้ จำนวน 4 อัน ยาวสองขนาด 1 และ 2 เซนติเมตร ก้านเกสรและอับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 4 พู 4 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ก้านเกสรสีเขียว ยอดเกสรเรียวแหลมเป็นรูเปิด พลาเซนตาดัดที่ฐาน

ชื่อ ชื่อปอข

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Acacia concinna* (Willd.) DC.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Leguminosae-Mimosoideae

ชื่ออื่นๆ ส้มขอน

ชื่อภาษาอังกฤษ -

ไม้รอเลื้อย ลำต้นสีเทา กิ่งอ่อนสีเขียว มีหนามตามลำต้น กิ่งและก้านใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่สองชั้น ยาว 7-20 เมตร ก้านใบยาว 3-5 เซนติเมตร ใบย่อยรูปขอบขนาน ขนาดเล็ก กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร โคนเฉียง ปลายมน ขอบเรียบ ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ดอกช่อกระจุกแน่นแยกแขนง ช่อดอกกลมคล้ายดอกกระถิน ออกที่ซอกก้านใบ ก้านดอกยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สีขาวนวล กลีบรวมสีน้ำตาลแดง รูปถ้วย เกสรเพศผู้สีขาวจำนวนมาก ยาวยื่นขึ้นเหนือกลีบรวม อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 2 พู 1 ช่อง แต่ละพูมี 1 ช่อง รังไข่เหนือวงกลีบ ยอดเกสรสีขาว พลาเซนตาแนวเดียว ผลแห้ง เป็นฝัก เมื่อแก่มีสีน้ำตาลดำ ผิวอ่อนขรุขระ ขอบเป็นคลื่น

ชื่อ เพ็ญฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Bougainvillea spectabilis* Willd.

ชื่อพ้อง -

ชื่อวงศ์ Nyctaginaceae


ชื่ออื่นๆ ทรายจีน, ดอกกระดาศ, ดอกโคม, ดอกค้างใบ, ศรีราชา

ชื่อภาษาอังกฤษ Paper-flower

ไม้รอเลื้อย สูงประมาณ 5 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล มีหนามแหลม ใบเดี่ยว ออกสลับ ก้านใบยาว 1-2 เซนติเมตร ตรงซอกใบมีหนามแข็ง แผ่นใบรูปสามเหลี่ยม กว้าง 3.8-5.5 เซนติเมตร ยาว 5.3-7.5 เซนติเมตร โคนมนหรือตัด ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบบางนุ่มเหนียว ด้านหลังใบสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ มีขนสีขาวตามเส้นใบ ดอกช่อกระจุกช่อ มีหลายสี ได้แก่ สีแดง สีชมพู สีส้ม สีม่วง สีขาวและสีทอง ออกที่ซอกก้านใบ ก้านช่อดอกยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร ดอกย่อยติดอยู่บนใบประดับ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร ใบประดับมีหลายสี จำนวน 3 อัน รูปกลมรี กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 2.5-3 เซนติเมตร โคนมน ปลายแหลม ขอบเป็นคลื่น เนื้อใบบางคล้ายกระดาษ มีเส้นใบสีเขียว กลีบเลี้ยงสีเขียว เป็นหลอดยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายจักเป็น 5 แฉก ผิวเป็นสัน ด้านนอกมีขน กลีบดอกสีขาว จำนวน 5 กลีบ ยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร ขอบหยักเป็นคลื่น เกสรเพศผู้ จำนวน 8 อัน ก้านเกสรสีเขียวเชื่อมติดกันเป็นท่อน อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 1 พู รังไข่เหนือวงกลีบ ก้านเกสรสีเขียว ยอดเกสรเป็นพู่ขนสีขาว พลาเซนตาที่ฐาน รังไข่ไม่พัฒนาเป็นผล



17



21



18



22



19



23



20



24

ภาพที่ 17 มะกอก

*Spondias pinnata* (L.f.) Kurz

ภาพที่ 18 น้อยหน่า

*Annona squamosa* L.

ภาพที่ 19 กระดังงาสงขลา

*Cananga odorata* (Lam.) Hook.f. & Thomson var.

*fruticosa* (Craib) Corner

ภาพที่ 20 ลำควน

*Melodorum fruticosum* Lour.

ภาพที่ 21 พญาสัตบรรณ

*Alstonia scholaris* (L.) R.Br.

ภาพที่ 22 ลั่นทมขาว

*Plumeria obtusa* L.

ภาพที่ 23 ลั่นทม

*Plumeria rubra* L.

ภาพที่ 24 ตาล


*Borassus flabellifer* L.



25



29



26



30



27



31



28



32

ภาพที่ 25 มะพร้าว

*Cocos nucifera* L. var. *nucifera*

ภาพที่ 26 ปาล์มน้ำมัน

*Elaeis guineensis* Jacq.

ภาพที่ 27 ตาลน้ำเงิน

*Latania loddigesii* Mart.

ภาพที่ 28 ปาล์มจีน

*Licuala grandis* H.Wendl.

ภาพที่ 29 ปาล์มจีน

*Livistona chinensis* (Jacq.) R.Br. ex Mart

ภาพที่ 30 ปาล์มสิบสองปันนา

*Phoenix loureiri* Kunth

ภาพที่ 31 อินทผลัม

*Phoenix dactylifera* L.

ภาพที่ 32 ตะลิงปลิง

*Averrhoa bilimbi* L.



33



36



39



34



37



40



35



38



41

ภาพที่ 33 หมากเหลียง

*Chrysalidocarpus lutescens* H.Wendl.

ภาพที่ 34 หมากเขียว

*Ptychosperma macarthurii* H.Wendl.

ภาพที่ 35 ปาล์มขวด

*Roystonea regia* (kunth) Cook

ภาพที่ 36 หมากนวล

*Veitchia merrillii* (Becc.)

H.E.Moore

ภาพที่ 37 ชมพูพันธุ์ทิพย์

*Tabebuia rosea* (Bertol.) DC.

ภาพที่ 38 สะเดา

*Azadirachta indica* A.Juss.

var. *siamensis* Valetton

ภาพที่ 39 กระถินณรงค์

*Acacia auriculaeformis* A.Cunn.

ex Benth.

ภาพที่ 40 กระถินพิมาน

*A. harmandiana* (Pierre) Gagnep.

ภาพที่ 41 แปรังล้างขวด

*Callistemon lanceolatus* DC.



42



46



43



47



44



48



45



49

ภาพที่ 42 ตีนเป็ดฝรั่ง

*Crescentia alata* HBK.

ภาพที่ 43 ศรีตรัง

*Jacaranda filicifolia* (Anderson) D.Don

ภาพที่ 44 ปีบ

*Millingtonia hortensis* L.f.

ภาพที่ 45 แคนเสด

*Spathodea campanulata* P.Beauv.

ภาพที่ 46 เหลืองอินเดีย

*Tabebuia chrysantha* (Jacq.) G.Nicholson

ภาพที่ 47 ชงโค

*Bauhinia purpurea* L.

ภาพที่ 48 กาลหลงเขา

*B. viridescens* Desv. var. *hissuta* K. & S.S.Larsen

ภาพที่ 49 ผ่าง

*Caesalpinia sappan* L.



50



54



51



55



52



56



53



57

ภาพที่ 50 ราชพฤกษ์

*Cassia fistula* L.

ภาพที่ 51 กาฬพฤกษ์

*Cassia grandis* L.f.

ภาพที่ 52 ชีเหลือกอมเมริกัน

*Senna spectabilis* (DC.) Irwin & Barneby

ภาพที่ 53 นนทรี

*Peltophorum pterocarpum* (DC.) Backer ex K.heyne

ภาพที่ 54 วาสุเทพ

*Phyllocarpus septentrionalis* Donn.Sm.

ภาพที่ 55 มะขาม

*Tamarindus indica* L.

ภาพที่ 56 สารภี

*Mamea siamensis* Kosterm.

ภาพที่ 57 ฝ้ายคำ

*Cochlospermum religiosum* (L.) Alston

58



62



59



63



60



64



61



65



ภาพที่ 58 หูกวาง

*Terminalia catappa* L.

ภาพที่ 59 สุวรรณเพดกษ์

*Cordia dentata* Poir.

ภาพที่ 60 มะขม

*Phyllanthus acidus* (L.) Skeels

ภาพที่ 61 อบเชย

*Cinnamomum bejolghota* (Buch.-Ham.) Sweet

ภาพที่ 62 อินทรีชิต

*Lagerstroemia loudonii* Teijsm & Binn.

ภาพที่ 63 อินทนิลน้ำ

*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.

ภาพที่ 64 จำปี

*Michelia alba* DC.

ภาพที่ 65 จำปา

*Michelia champaca* L.



66




70



67



71



68



72



69



73

ภาพที่ 66 เสียน

*Melia azedarach* L.

ภาพที่ 67 กระถิน

*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

ภาพที่ 68 มะขามเทศ

*Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth.

ภาพที่ 69 ขนุน

*Artocarpus heterophyllus* Lam.

ภาพที่ 70 ไทรใบค่าง

*Ficus benjamina* L. var. *variegata*

ภาพที่ 71 ไทรช้อยใบหูก

*Ficus retusa* L. var. *retusa*

ภาพที่ 72 มะรุม

*Moringa oleifera* Lam.

ภาพที่ 73 ยูคาลิป

*Eucalyptus citriodora* Hook.



74



78



75



79



76



80



77



81

ภาพที่ 74 หวี

*Syzygium cumini* (L.) Skeels

ภาพที่ 75 ฝรั่ง

*Psidium guajava* L.

ภาพที่ 76 ทองกวาว

*Butea monosperma* (Lam.) Taub.

ภาพที่ 77 ทองหลางสาย

*Erythrina variegata* L.

ภาพที่ 78 ประดู่บ้าน

*Pterocarpus indicus* Willd.

ภาพที่ 79 แคบ้าน

*Sesbania grandiflora* (L.) Desv.

ภาพที่ 80 พุทรา

*Ziziphus mauritiana* Lam.

ภาพที่ 81 ชำมะเลียง

*Lepisanthes fruticosa* (Roxb.) Lecnh.



82



86



83



87



84



88



85



89

ภาพที่ 82 พิกุล

*Mimusops elengi* L.

ภาพที่ 83 ตะขบฝรั่ง

*Muntingia calabura* L.

ภาพที่ 84 เสนียด

*Justicia adhatoda* L.

ภาพที่ 85 อังคาบ

*Barleria cristata* L.

ภาพที่ 86 ไบเจิน

*Graptophyllum pictum* (L.) Griff.

ภาพที่ 87 ทองพันชั่ง

*Rhinacanthus nasutus* (L.) Kurz

ภาพที่ 88 มะผู้มะเนียง

*Cordyline fruticosa* (L.) Göpp.

ภาพที่ 89 ชวนชม

*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.



90



94



91



95



92



96



93



97

ภาพที่ 90 บานบุรีเหลือง

*Allamanda cathartica* L.

ภาพที่ 91 หนามแดง

*Carissa carandas* L.

ภาพที่ 92 ชีโจ

*Nerium oleander* L.

ภาพที่ 93 บานทน

*Strophanhus grutus* Franch.

ภาพที่ 94 พุดจีบ

*Tabernaemontana divaricata* (L.) R.Br. ex Roem. & Schult.

ภาพที่ 95 พุดฝรั่ง

*Tabernaemontana pandacaqui* Poir.

ภาพที่ 96 กะดังใบ

*Leea indica*. (Burm.f.) Merr.

ภาพที่ 97 กระบอง

*Thevetia peruviana* (Pers.) K.Schum.



98



102



99



103



100



104



101



105

ภาพที่ 98 หนวดปลาหมึกเขา

*Schefflera bengalensis* Gamble

ภาพที่ 99 กรูขาทองคำ

*Polyscias pinnata* J.R.Forst. & G.Forst.

ภาพที่ 100 จิ้ง

*Rhaps excelsa* (Thunb.) Henry ex Rehder

ภาพที่ 101 วิก

*Calotropis gigantea* (L.) Dryander ex W.T.Aiton

ภาพที่ 102 ขลุ่

*Pluchea indica* (L.) Less.

ภาพที่ 103 ค้านเสด

*Bixa orellana* L.

ภาพที่ 104 ราชาวดี


*Buddleja paniculata* Wall.

ภาพที่ 105 กาทหลง

*Bauhinia acuminata* L.



106



109



112



107



110



113



108



111



114

ภาพที่ 106 รัตตมา

*Parkinsonia aculeata* L.

ภาพที่ 107 สัก

*Tectona grandis* L.f.

ภาพที่ 108 เหวือกปลาหมอขาว

*Acanthus ebracteatus* Vahl

ภาพที่ 109 ประเดหวิ

*Dracaena fragrans* (L.) Ker Gawl.

ภาพที่ 110 ปีกไก่ดำ

*Justicia fragilis* Wall.

ภาพที่ 111 จันทน์แดง

*Dracaena loureiri* Gagnep.

ภาพที่ 112 โมกบ้าน

*Wrightia religiosa* Benth ex Kurz

ภาพที่ 113 ปาล์มไผ่

*Chamaedorea erumpens* H.E.Moore

ภาพที่ 114 หางนกยูงไทย

*Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw.



115



119



116



120




117



121



118



122

ภาพที่ 115 ชุมเห็ดเทศ

*Senna alata* (L.) Roxb.

ภาพที่ 116 ทรงบาดาล

*Senna surattensis* (Burm.f.) Irwin & Bameby

ภาพที่ 117 ชิงชี

*Capparis micracantha* DC.

ภาพที่ 118 ปรองอูญี่ปุ่น

*Cycas revoluta* Thunb.

ภาพที่ 119 ซาฮกเกี้ยน

*Carmona retusa* (Vahl) Masam.

ภาพที่ 120 มะกา

*Bridelia ovata* Decne.

ภาพที่ 121 โป๊ยเซียน

*Euphorbia milii* Des Moul.

ภาพที่ 122 กำสังกระเบื้อง

*Excoecaria cochinchinensis* Lour. var. *cochinchinensis*




123



127



124



128



125



129



126



130

ภาพที่ 123 สตุงแดง

*Jatropha gossypifolia* L.

ภาพที่ 124 หนุมานนั่งแท่น

*Jatropha podagrica* Hook.f.

ภาพที่ 125 แสยก

*Pedilanthus tithymaloides* (L.) Poit.

ภาพที่ 126 ว่านขจรฉีสาร

*Phyllanthus pulcher* Wall. ex Müll.Arg.

ภาพที่ 127 พญารากห่อ

*Leea macrophylla* Roxb. ex Hornem.

ภาพที่ 128 ชี่เซ่ง

*Lagerstroemia indica* L.

ภาพที่ 129 จำปีแขก

*Michelia figo* (Lour.) Spreng.

ภาพที่ 130 ชบา

*Hibiscus rosa-sinensis* L.



131



135



132



136



133



137



134



138

ภาพที่ 131 กระเจี๊ยบแดง

*Hibiscus sabdariffa* L.

ภาพที่ 132 หม่อน

*Morus alba* L.

ภาพที่ 133 รามใหญ่

*Ardisia elliptica* Thunb.

ภาพที่ 134 มิกกี้เมาส์

*Ochna kirkii* Oliv.

ภาพที่ 135 มะลิลา

*Jasminum sambac* (L.) Aiton

ภาพที่ 136 พุดซ้อน

*Gardenia augusta* (L.) Merr.

ภาพที่ 137 ประทัดทอง

*Hamelia patens* Jacq.

ภาพที่ 138 เข็มฝรั่ง

*Ixora coccinea* L.



139



143



140




144



141



145



142



146

ภาพที่ 139 เข็มพวงขาว

*Ixora finlaysoniana* Wall. ex G. Don

ภาพที่ 140 เข็มเศรษฐี

*Ixora macrothyrsa* Teijsm. & Binn.

ภาพที่ 141 แก้ว

*Murraya paniculata* (L.) Jack

ภาพที่ 142 ประทัดฝรั่ง

*Russelia equisetiformis* Schtdl. & Cham

ภาพที่ 143 ประทัดจีน

*Quassia amara* L.

ภาพที่ 144 ลำโพง

*Datura metel* L. var. *metel*

ภาพที่ 145 มะแว้งต้น

*Solanum indicum* L.

ภาพที่ 146 นมสวรรค์

*Clerodendrum paniculatum* L. var. *paniculatum*



147



150



153



148



151



154



149



152



155

ภาพที่ 147 โกสน  
*Codiaeum variegatum* Blume  
ภาพที่ 148 คองแตก  
*Baliospermum solanifolium*  
(Burm.) Suresh  
ภาพที่ 149 เปล้าน้อย  
*Croton stellatopilosus* Ohba

ภาพที่ 150 ปิดตาเวีย  
*Jatropha integerrima* Jacq.  
ภาพที่ 151 มันสำปะหลังด่าง  
*Manihot esculenta* Crantz var.  
*variegata*  
ภาพที่ 152 เทียนกิ่ง  
*Lawsonia inermis* L.

ภาพที่ 153 เขยต่าย  
*Glycosmis pentaphylla* (Retz.) DC.  
ภาพที่ 154 เข้ายาม่อม  
*Clerodendrum petasites* (Lour.)  
S.Moore  
ภาพที่ 155 คนทีเขมา  
*Vitex negundo* L.



156



160



157



161



158



162



159



163

ภาพที่ 156 ฟองสมุทร

*Duranta repens* L.

ภาพที่ 157 ผกากรอง

*Lantana acamara* L.

ภาพที่ 158 ปั้งหอม

*Clerodendrum chinense* (Osbeck) Mabb.

ภาพที่ 159 ฟีทะลายโจร

*Andrographis paniculata* (Burm.f.) Wall. ex Nees

ภาพที่ 160 ค่างเดิน

*Canthium glabrum* Blume

ภาพที่ 161 ว่านหางจระเข้

*Aloe vera* (L.) Burm.f.

ภาพที่ 162 พลับพลึง

*Crinum asiaticum* L.

ภาพที่ 163 เขียวหมื่นปี

*Aglaonema modestum* Schott



164



168



165



169



166



170



167



171

ภาพที่ 164 ขี้เหล็กหลังลาย

*Asplenium nidus* L. var. *nidus*

ภาพที่ 165 ดาวกระจาย

*Cosmos sulphureus* Cav.

ภาพที่ 166 ว่านมหากาฬ

*Gynura pseudochina* (L.) DC. var. *hispida* Thwaites

ภาพที่ 167 ผักคราด

*Acemella oleracea* (L.) R.K.Jansen

ภาพที่ 168 กระจุดทองเลื้อย

*Wedelia trilobata* (L.) Hitchc.

ภาพที่ 169 กระจุดแสด

*Zinnia linearis* Benth.

ภาพที่ 170 เทียนดอก

*Impatiens balsamina* L.

ภาพที่ 171 ปีบฝรั่ง

*Laurentia longiflora* (L.) Peterm.



172



175



178



173



176



179



174



177



180

ภาพที่ 172 ว่านงาช้าง

*Sansevieria cylindrica* Bojer

ภาพที่ 173 หงอนไก่ไทย

*Celosia argentea* L.

ภาพที่ 174 พลับพลึงดินเป็ด

*Hymenocallis littoralis* Salisb

ภาพที่ 175 ว่านหมื่นปี

*Dieffenbachia seguine* (Jacq.)

Schott var. *seguine*

ภาพที่ 176 นางพญาหงสา

*Dieffenbachia daguensis* Engl.

ภาพที่ 177 พุทธรักษา

*Canna* hybrid

ภาพที่ 178 มะละกอ

*Carica papaya* L.

ภาพที่ 179 ทองสามย่าน

*Kalanchoe integra* (Medik.) Kuntze

ภาพที่ 180 กระเพรา

*Ocimum tenuiflorum* L.



181



185



182



186



183



187



184



188

ภาพที่ 181 ว่านหอยแครง

*Tradescantia spathacea* Stearn

ภาพที่ 182 สร้อยกัทลี

*Heliconia rostrata* Ruiz & Pavon

ภาพที่ 183 ฉานีผสมแก้ว

*Plectranthus scutellarioides* (L.) R.Br.

ภาพที่ 184 หอเจ้าหนูคัน

*Dianella ensifolia* (L.) DC.

ภาพที่ 185 พระจันทร์ครึ่งซีก

*Lobelia chinensis* Lour.

ภาพที่ 186 กลัวย่นัว

*Musa sapientum* L.

ภาพที่ 187 บัวสาย

*Nymphaea pubescens* Willd.

ภาพที่ 188 เดยหอม

*Pandanus amaryllifolius* Roxb.



189



193



190



194



191



195



192



196

ภาพที่ 189 ตะขาบปิน

*Muehlenbeckia platyclada* (F.Muell.) Meisn.

ภาพที่ 190 แพร่เขียงไต้

*Portulaca grandiflora* Hook.f.

ภาพที่ 191 จันทร์กระจ่างฟ้า

*Macfadyena unguis-cati* L.

ภาพที่ 192 สวาด

*Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb.

ภาพที่ 193 เล็บมือนาง

*Quisqualis indica* L.

ภาพที่ 194 ผักคำสิง

*Coccinia grandis* (L.) Voigt

ภาพที่ 195 กาฝากมะม่วง

*Dendrophthoe pentandra* (L.) Miq.

ภาพที่ 196 อัญชัน

*Clitoria ternatea* L.



197



200



203



198



201



204



199



202



205

ภาพที่ 197 หู้าหนวดแมว

*Orthosiphon aristatus* (Blume) Miq.

ภาพที่ 198 อ้อยแดง

*Saccharum officinarum* L.

ภาพที่ 199 ผักคบบชา

*Eichhornia crassipes* (C.Mart.) Solms

ภาพที่ 200 ข่า

*Alpinia galanga* (L.) Milld.

ภาพที่ 201 ข่าน้ำ

*Alpinia nigra* (Gaertn.) Burtt

ภาพที่ 202 ฮรพิม

*Bauhinia winitii* Craib

ภาพที่ 203 โทกกระชอม

*Cardiospermum halicacabum* L.

ภาพที่ 204 คีปลี

*Piper retrofractum* Vahl

ภาพที่ 205 พลุ

*Piper betle* L.



206



210



207



211



208



212



209



213

ภาพที่ 206 รางจืด

*Thunbergia laurifolia* Lindl.

ภาพที่ 207 เครือหัดสาม

*Cayratia trifolia* (L.) Domin

ภาพที่ 208 ลิ่นจู่เห่า

*Clinacanthus siamensis* Bremek.

ภาพที่ 209 การเวก

*Artabotrys siamensis* Miq.

ภาพที่ 210 เถืองฟ้า

*Bougainvillea spectabilis* Willd.

ภาพที่ 211 มะแว้งเครือ

*Solanum trilobatum* L.

ภาพที่ 212 สามง่า

*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.

ภาพที่ 213 ช้องแมว

*Gmelina philippensis* Cham.