

การศึกษารวบรวมวิธีการรักษากรณีศึกษาในสมัยโบราณที่เกี่ยวข้องกับ ทุษฎีความเครียดกังวลทำลายปอด

The Research And The Management Treatment Methods From The Ancient Case Record About The Theory Of Melancholy Impairing Lung

Zhenlin Yang

คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Email : yangzhenlin85@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลการรักษาอาการหรือโรคที่มีสาเหตุตามทุษฎี “อารมณ์เศร้า กังวลทำลายปอด” ของทางการแพทย์แผนจีน โดยใช้วิธีการสืบค้นรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ หนังสือบันทึกกรณีศึกษาในสมัยโบราณ คำสอนแพทย์แผนจีน และคัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน สรุปรวมวิธีการใช้ยาในการรักษาอาการหรือโรคที่มีสาเหตุตามแนวทางทุษฎี “ความเศร้ากังวลทำลายปอด” ผลการศึกษาพบว่า ยาบำรุงปอดและม้าม และยาที่ผ่านเส้นลมปราณตอกับตับ ยาที่มีฤทธิ์อุ่น และยาที่มีรสหวานเข้ม มีความถี่การใช้สูงที่สุด ส่วนยาฤทธิ์ร้อนมีความถี่ในการใช้ต่ำที่สุด โดยยาดังกุย หงษ์ และโสมคณซึ่งเป็นยาที่มีฤทธิ์บำรุงซึ่และเลือดเป็นตัวยาที่มีความถี่การใช้สูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าหลักการใช้ยาในการรักษาอาการหรือโรคที่มีสาเหตุตามทุษฎี “อารมณ์เศร้า กังวลทำลายปอด” ใช้หลักการ “รักษาปอดต้องปรับที่ม้าม” การใช้ยาอยู่บนพื้นฐานของการบำรุงซึ่และเลือดเพิ่มพลังปอดปรับการไหลเวียนของซึ่และเลือด และระบบร้อน สายสเมหะที่เกาดิติดเป็นหลัก ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาอาการหรือโรคทางคลินิกที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าวได้

คำสำคัญ : การแพทย์แผนจีน ความเศร้ากังวล ปอด

Abstract

The objective of this research is to study the collection of information on the treatment of symptoms or diseases that are theoretical causes. "Sad emotions, worrying, destroying the lungs" of Chinese medicine. By using search methods to collect information from information sources, Ancient case study notes Chinese medicine teachings and ancient Chinese medicine Summarize the method of using drugs to treat symptoms or diseases that are the theoretical causes. "Sadness, worry, destruction of the lungs" The study found that Lung and spleen tonic And medications that pass through the kidney meridian and liver Warm-up medicine And medicine that has a bitter sweet taste With the highest usage frequency The hot potion drug has the lowest frequency of use by the Danggui, Huang Qi and Ginseng , which are the most effective drugs for qi and blood. Shows that the principles of drug use in the treatment of symptoms or diseases that are theoretical causes "Sad emotions, worrying, destroying the lungs" Use the principle of "Keeping the lungs to be

adjusted at the spleen". Spleen supplement increases lung power, adjusts circulation of qi Nourish qi, blood and ventilate heat, break up the main phlegm that sticks The results can be used as a guideline for treatment of clinical symptoms or diseases caused by such causes.

Keywords : Traditional Chinese Medicine, Melancholy, lung

บทนำ

ปัจจุบันการเกิดโรคที่เกิดจากผลกระทบทางอารมณ์ มีอัตราการเกิดสูงขึ้น (Hao Zhi, 2009: 60) ความเครียด ความเศร้า กังวล เป็นสาเหตุการเกิดโรคอย่างหนึ่งในทางการแพทย์แผนจีน ทฤษฎี “ความเศร้ากังวลทำลายปอด” เป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดโรคที่ถูกจดบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน โดยเชื่อว่า ความเศร้าเสียใจ ความวิตกกังวลเป็นสาเหตุการเกิดโรคที่ทำให้การทำงานของอวัยวะปอดผิดปกติ จะแสดงอาการผิดปกติที่ปอด รวมถึง อวัยวะอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับปอดได้ การใช้ยาจีนในการรักษาอาการหรือโรคที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าวมีการจดบันทึกไว้ ตั้งแต่ในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน บทความนี้จึงได้สรุปผลการศึกษาร่วมข้อมูลการใช้ยาในการรักษา เพื่อเป็น แนวทางในการใช้ยาจีนรักษาอาการหรือโรคดังกล่าวทางคลินิกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาร่วมข้อมูลและสรุปวิธีการรักษาอาการหรือโรคที่มีสาเหตุตามทฤษฎี “อารมณ์เศร้ากังวลทำลายปอด” ของทางการแพทย์แผนจีนด้วยยาจีน

วิธีดำเนินการวิจัย

ใช้วิธีการสืบค้นรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ หนังสือบันทึกกรณีศึกษาในสมัยโบราณ คำสอนแพทย์แผนจีน และคัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน บันทึกข้อมูลการรักษาลงในแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ แยกแยะความถี่ และร้อยละ และนำผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย

ผลการวิจัย


จากการศึกษาร่วมข้อมูล พบว่ามีคัมภีร์โบราณและหนังสือที่บันทึกการรักษาอาการหรือโรคที่เกิดจาก ความเศร้ากังวลทำลายปอด จำนวน 15 เล่ม เป็นหนังสือที่อยู่ในช่วงราชวงศ์หมิงชิง บันทึกอาการหรือโรคที่แตกต่าง กัน เช่น ไข้ตัวร้อน หอบหืด อาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด เป็นต้น แต่สาเหตุการเกิดโรค คือ ความเศร้ากังวล ทำลายปอด เมื่อนอก

ตารางที่ 1 แหล่งข้อมูลที่ค้นพบว่ามีการรักษาอาการหรือโรคที่เกิดจากอารมณ์เศร้ากังวลทำลายปอด

ลำดับ	แหล่งข้อมูล	ช่วงยุคสมัย	ชื่อโรค
1	หนังสือบันทึกกรณีศึกษาช่วงหมิงอีเลี่ยอัน	ราชวงศ์ชิง เวียจือชิ่ว	ไข้ตัวร้อน
2	หนังสือบันทึกกรณีศึกษาหลินจีงจือหานานอีอัน	ราชวงศ์ชิง เย่เทียนชื่อ	หอบหืด
3	หนังสือบันทึกกรณีศึกษาช่วงหมิงอีเลี่ยอัน	ราชวงศ์ชิง เวียจือชิ่ว	อาเจียนเป็นเลือด


4	หนังสือตัวพ่างอีอันต้าเฉิง เนี่ยงเสว่	ราชวงศ์หมิง ฉินห่างกวี่	ปั๊สสาจะเป็นเลื่อต
5	หนังสือกูจินอีอันอัน	ราชวงศ์ชิง หยีเจี้้น	ปวดเอว
6	หนังสือบันทึกกรณีศึกษาชาชีวทมิภีเลี่ยอัน	ราชวงศ์ชิง เถี่ยจือชิ่ว	โรคเครียด
7	หนังสือกรณีศึกษาของแพทย์ผู้มีเชื้อเสียง	ราชวงศ์หมิง เจียงกั่วน	ไม่มีแรง
8	บันทึกกรณีศึกษาเส่าย่าจง	ราชวงศ์ชิง เขวเสว่	เสียงหาย
9	บันทึกตำรับยาของชวีพในวัยชราแล้ว จริง	ราชวงศ์ชิง เยี้เตียนชื่อ	ปวดท้อง
10	หนังสือบันทึกกรณีศึกษาชาชีวทมิภีเลี่ยอัน	ราชวงศ์ชิง เถี่ยจือชิ่ว	คุ้มคลัง
11	หนังสือกรณีศึกษาชูผู้	ราชวงศ์ชิง เจี้้งจังกง	ไอ
12	หนังสือบันทึกกรณีศึกษาของหายใจทาง	ราชวงศ์ชิง หยีจูทาง	คลื่นไส้อาเจียน
13	หนังสือบันทึกกรณีศึกษาของหายใจทาง	ราชวงศ์ชิง หยีจูทาง	เนื้องอก
14	บันทึกกรณีศึกษาชาชีวทมิภีเลี่ยอัน	ราชวงศ์หมิง เจียงกั่วน	ปวดซื้อ
15	หนังสือบันทึกกรณีศึกษาทางคลินิกของ หวังชู่เกา	ราชวงศ์ชิง หวังชู่เกา	ควบคุมการหลังอสุจิ
16	หนังสือบันทึกกรณีศึกษาของหายใจทาง	ราชวงศ์ชิง หยีจูทาง	ปวดบวม
17	บันทึกกรณีศึกษาแพทย์จีนผู้มีเชื้อเสียง เลเมต่อ	ราชวงศ์หมิง เจียงกั่วน ราชวงศ์ชิง เวี่ยจือชิ่ว	มะเร็งเต้านม
18	หนังสืออีซูโอ้วอุน	ราชวงศ์ชิง หลีตัว	ประจำเดือนมาก
19	บันทึกกรณีทางนรีเวช	ราชวงศ์หมิง เขวจี	ภาวะขาดประจำเดือน
20	บันทึกกรณีศึกษาที่พบทางคลินิก	ราชวงศ์ชิง หัวอือ	ภาวะขาดประจำเดือน

จากการรวมรวมข้อมูลด้านการใช้ยาจีนในการรักษาอาการหรือโรคที่เกิดจากภัยธรรมชาติรักษาผลทำลายปอด พบร่วายจีนที่มีความถี่ในการใช้สูงที่สุด ได้แก่ ยาที่ผ่านเส้นลมปราณม้าม รองลงมา ได้แก่ ยาที่ผ่านเส้นลมปราณปอด และเส้นลมปราณหัวใจ




รูปที่ 1 ตัวยาที่ผ่านเส้นลมปราณต่าง ๆ

เมื่อจำแนกยาตามฤทธิ์ร้อนเย็นทั้ง 4 พบว่า ยาที่นำมาใช้รักษามากที่สุด คือยาที่มีฤทธิ์อุ่น รองลงมาเป็นยาที่มีฤทธิ์เย็นมาก ส่วนยาฤทธิ์เผ็ดร้อน มีการนำมาใช้รักษาน้อยที่สุด




รูปที่ 2 ฤทธิ์ร้อนเย็นทั้ง 4 ของตัวยา

เมื่อจำแนกยาโดยใช้หลักรสยาทั้ง 5 พบว่า ยารสหวาน เป็นยาที่มีการนำมาใช้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ยารสขม และรสเผ็ดตามลำดับ โดยยารสเข้ม มีการนำมาใช้น้อยที่สุด



รูปที่ 3 รสยาทั้ง 5 ของตัวยา

เมื่อจำแนกตามสรรพคุณยา พบว่า ยาที่นำมาใช้บ่อยที่สุด คือ ยาบำรุงซี่ รองลงมา “ได้แก่” ยาบำรุงเลือด ยาขับน้ำ ยาปรับการไหลเวียนของซี่ และยากระจายลมร้อน ตามลำดับ



รูปที่ 4 สรรพคุณของตัวยา

ตัวยาที่นำมาใช้ในการรักษา พบว่า ยาตั้งกุย ซึ่งเป็นยาบำรุงเลือด เป็นยาที่นิยมนำมาใช้บ่อยที่สุด รองลงมาได้แก่ หวานชี โสมคน ที่มีฤทธิ์บำรุงซี่ และเปลือกส้ม ไพร์สัน ที่เป็นยาบำรุงม้าม สลายเสมหะชั้น

ตารางที่ 2 ความถี่ของตัวยาที่ใช้ในการรักษา

ลำดับ	ยาจีน	ความถี่ในการใช้ (ร้อยละ)	ลำดับ	ยาจีน	ความถี่ในการใช้ (ร้อยละ)
1	ตั้งกุย	13.16	10	เชิงหมาย	5.26
2	หวานชี	13.16	11	เจ้อเสีย	5.26
3	โสมคน	9.66	12	หวานชวง	4.39
4	เปลือกส้ม	8.77	13	เจี้ยนเกิ่ง	4.39
5	ไพร์สัน	7.89	14	มายตง	4.39
6	ไอหู	7.02	15	หมู่ตันผี	4.39
7	สูตี้	6.14	16	ญี่ชียง	4.39
8	พุทราจีน	5.26	17	ชาเนย่า	3.51
9	หวงอิน	5.26			

อภิปรายและสรุปผล

1. การเลือกใช้ยาตามหลักการฝ่านเส้นลมปราณของยา

จากข้อมูลที่ได้จะเห็นว่า ยาที่เลือกใช้ส่วนใหญ่เป็นยาที่ฝ่านเส้นลมปราณม้าม เส้นลมปราณปอด เส้นลมปราณหัวใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรักษาที่เน้นไปที่การทำงานของอวัยวะม้าม ปอด และหัวใจ (เลือด) แพทย์แผน

จินเชื่อว่าปอดเปรียบเสมือนฟ้า มีหน้าที่หายใจเข้าออก รับเอาซีบริสุทธิ์ (清氣) เข้าสู่ร่างกาย ม้ามมีหน้าที่ลำเลียงสารจำเป็นที่ได้จากการรับประทานอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกาย เปรียบเสมือนดิน ฟ้าดินทำงานสัมพันธ์กัน จึงเกิดสรรพสิ่งเจริญของตามตามธรรมชาติ อารมณ์ศรั้งกังวลที่มาก หรือต่อเนื่องนานเกินไป จะทำให้ชีวุกทำลาย (悲则气消)(Sun Guangren,2005:225) ทำให้ปอดและม้ามซึ่งร่อง เกิดความผิดปกติทั้งในด้านการเกิดชีวิต(ปอด) และการเกิดเลือด (ม้าม) ดังนั้นการรักษาจึงมุ่งใช้ยาที่รักษาอวัยวะม้ามและปอด อย่างชัดเจน

2. การเลือกใช้ยาตามหลักทั้งร้อนเย็นทั้ง 4

จากข้อมูลจะเห็นว่า ตามหลักทั้งร้อนเย็นทั้ง 4 การรักษาอาการหรือโรคที่เกิดจากความเคร็งกังวลทำลายปอด ส่วนใหญ่ใช้ยาที่มีฤทธิ์อุ่น รองลงมาจะใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นมาก จะเห็นได้ว่า การรักษาจะมุ่งเน้นการอุ่นบำรุงร่วมกับการใช้ยาที่เย็นมาก เนื่องจากการเกิดภาวะซึ่งปอดพร่อง จะทำให้เกิดการบีบกันของช่องท้อง ทำให้เปลวียนไม่สะอาด ซึ่ดดังจะเกิดความร้อน จึงมีการใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็น ระบบความร้อนที่เกิดขึ้นนี้ร่วมกับการใช้ยาบำรุง

3. การเลือกใช้ยาตามหลักรสยาทั้ง 5

จากข้อมูลเมื่อนำยามาจำแนกตามหลักรสยาทั้ง 5 พบว่า ยารสหวานมีการนำมาใช้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ยาที่มีรสขม ซึ่งสัมพันธ์กับผลการจำแนกตามหลักทั้งร้อนเย็นทั้ง 4 ที่แสดงให้เห็นแล้วว่า จะใช้ยาบำรุงร่วมกับยา ระบบความร้อน ซึ่งยาบำรุงส่วนใหญ่มีฤทธิ์อุ่น รสหวาน ส่วนยาระบายความร้อนจะมีฤทธิ์เย็น รสขม

4. การเลือกตัวยาที่ใช้ในการรักษา

ตัวยาที่นำมาใช้บ่อยสามอันดับแรก ได้แก่ยาตังกุย หงวนซี โสมคน ซึ่งเป็นยาบำรุงเลือดและชีวิต สำคัญและใช้บ่อยในการรักษากลุ่มอาการที่มีซึ่งพร่อง เลือดพร่อง จะเห็นได้ว่า แพทย์จีนสมัยโบราณ ให้ความสำคัญต่อการบำรุงชีวิต ซึ่งมีการใช้ร่วมกับยากลุ่มเสริมม้าม сл้ายเสมอ ปรับการไฟลเวียนของลมปราณ และยาระบายความร้อนดังที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้การรักษาที่ครอบคลุมและได้ผลการรักษาตามเป้าหมายมากที่สุด

สรุป

การรักษาอาการหรือโรค ที่เกิดจากความเคร็งกังวลทำลายปอด เป็นแนวคิดการรักษาโรคทางการแพทย์แผนจีน ที่มุ่งเน้นถึงสาเหตุทางอารมณ์ ผลกระทบร่างกาย จนทำให้เกิดโรค ลักษณะการเกิดโรคชนิดนี้ มีการจดบันทึกไว้ตั้งแต่ในสมัยโบราณ รวมถึงการใช้ยาในการรักษา งานวิจัยได้ทำการรวบรวม และสรุปแนวคิดและการใช้ยากับกรณีศึกษาที่มีการจดบันทึกไว้ในหนังสือและคัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผน ซึ่งจากการรวมรวมข้อมูลพบว่า การรักษาอาการหรือโรคที่เกิดขึ้นจากการมีความเคร็งกังวลทำลายปอดนี้ มุ่งเน้นการบำรุงความพร่องให้กับอวัยวะปอดและม้าม โดยใช้ยาบำรุงซึ่ง เสริมม้าม บำรุงเลือด เป็นหลักร่วมกับใช้ยาระบายร้อน сл้ายเสมอ อย่างไรก็ตาม การแพทย์แผนจีนยังคงให้ความสำคัญต่อการจำแนกโรคตามกลุ่มอาการ และหลักการการพัฒนาของโรค ซึ่งการเลือกใช้ยา จำเป็นต้องมีการปรับเพื่อนำไปใช้ เพื่อให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

เอกสารอ้างอิง

Hao Zhi. (2009). จิตบำบัดแพทย์แผนจีน.ปักกิ่ง: เทเรนหมินเว่ยเชิง.

Sun Guangren. (2005). พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน.ปักกิ่ง: จงกั่งจงอี้เย่า.