

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| บทคัดย่อ..... | (1) |
| Abstarct..... | (3) |
| กิตติกรรมประกาศ..... | (5) |
| สารบัญ..... | (6) |
| สารบัญตาราง..... | (8) |
| สารบัญแผนภูมิ..... | (9) |
| | |
| บทที่ | |
| 1. บทนำ | |
| 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา..... | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมติฐาน..... | 5 |
| 1.3 ขอบเขตของการศึกษา..... | 6 |
| 1.4 ข้อจำกัดของการวิจัย..... | 6 |
| 1.5 คำนิยามศัพท์..... | 7 |
| 2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | |
| 2.1 ภาวะสูดสำลักขี้เทา (Meconium Aspiration Syndrome : MAS)..... | 12 |
| 2.2 ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดภาวะสูดสำลักขี้เทา..... | 16 |
| 2.3 ภาวะแทรกซ้อนและการพยากรณ์โรค..... | 25 |
| 2.4 การป้องกันการเกิดทารกที่มีภาวะสูดสำลักขี้เทาและแนวทางการดูแลรักษา ทารกที่มีภาวะสูดสำลักขี้เทา..... | 27 |
| 2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... | 30 |
| 3. ระเบียบวิธีวิจัย | |
| 3.1 วิธีการศึกษา..... | 35 |
| 3.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา..... | 35 |

สารบัญ (ต่อ)

| บทที่ | หน้า |
|---|------|
| 3.3 กลุ่มตัวอย่าง..... | 35 |
| 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา..... | 37 |
| 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล..... | 38 |
| 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล..... | 39 |
| 4. ผลการศึกษา | |
| 4.1 ลักษณะทั่วไปของมารดาที่มีภาวะสูดสำคัญี่เทาและกลุ่มเปรียบเทียบ..... | 40 |
| 4.2 ภาวะแทรกซ้อนของทารกแรกเกิดที่มีภาวะสูดสำคัญี่เทาและกลุ่มเปรียบเทียบ... | 50 |
| 4.3 การดูแลรักษาและผลการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะสูดสำคัญี่เทาและ กลุ่มเปรียบเทียบ | 51 |
| 4.4 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสูดสำคัญี่เทา..... | 53 |
| 5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ | |
| 5.1 สรุปผลการศึกษา..... | 59 |
| 5.2 ผลการศึกษา..... | 62 |
| 5.3 อภิปรายผล..... | 69 |
| 5.4 ข้อเสนอแนะ..... | 78 |
| บรรณานุกรม..... | 82 |
| ภาคผนวก | |
| แบบสอบถาม..... | 90 |
| ประวัติผู้เขียน..... | 93 |

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|---|------|
| 4.1 ร้อยละของมารดาทารกที่เกิดภาวะสูงสุดสำคัญชี้เทาและกลุ่มเปรียบเทียบ จำแนกตามลักษณะทั่วไป..... | 41 |
| 4.2 ร้อยละของมารดาทารกที่เกิดภาวะสูงสุดสำคัญชี้เทาและมารดาทารกกลุ่ม เปรียบเทียบจำแนกตามวิธีการคลอดและผู้ทำคลอด..... | 42 |
| 4.3 ร้อยละของมารดาทารกที่เกิดภาวะสูงสุดสำคัญชี้เทาและมารดาทารกกลุ่ม เปรียบเทียบจำแนกตามภาวะแทรกซ้อนของมารดาขณะตั้งครรภ์..... | 44 |
| 4.4 ร้อยละของมารดาทารกที่เกิดภาวะสูงสุดสำคัญชี้เทาและมารดาทารกกลุ่ม เปรียบเทียบจำแนกตามภาวะแทรกซ้อนของมารดาขณะรอคลอด..... | 45 |
| 4.5 ร้อยละของมารดาที่ทารกเกิดภาวะสูงสุดสำคัญชี้เทาและทารกกลุ่มเปรียบเทียบ จำแนกตามภาวะแทรกซ้อนของทารกในครรภ์ขณะรอคลอด..... | 47 |
| 4.6 ร้อยละของทารกที่เกิดภาวะสูงสุดสำคัญชี้เทาและกลุ่มเปรียบเทียบจำแนกตาม ลักษณะทั่วไป..... | 48 |
| 4.7 ร้อยละของทารกที่เกิดภาวะสูงสุดสำคัญชี้เทาและทารกกลุ่มเปรียบเทียบจำแนก ตามภาวะแทรกซ้อนที่พบหลังคลอด..... | 51 |
| 4.8 ร้อยละของทารกที่เกิดภาวะสูงสุดสำคัญชี้เทาและทารกกลุ่มเปรียบเทียบจำแนก ตามลักษณะการดูแลทารกแรกเกิดและผลการรักษา..... | 52 |
| 4.9 Odds Ratio ของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสูงสุดสำคัญชี้เทาในทารกแรกเกิด เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วย (MAS) และกลุ่มเปรียบเทียบ (control)..... | 54 |

สารบัญแผนภูมิ

| แผนภูมิที่ | หน้า |
|-------------------------------------|------|
| 2.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา..... | 34 |

